

SCHEDA N° 0231

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Inocybe</i>	SPECIE <i>I. obsoleta</i>	AUTORE (Quadr. & Lunghini) Valade	
DATA DI RACCOLTA 16/05/2018	LUOGO DI RACC. parco cittadino	COMUNE Vedelago	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 43	I.G.M. II 104	RACCOGLITORE Dino Giuseppe Cerantola	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> RADO |
| BOSCO DI: LATIFOLIA | | <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO | <input type="checkbox"/> MORTO |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Fraxinus ornus, Quercus sp., Ostrya carpinifolia e Populus sp.

NOTE : stazione di crescita saprofita di alcuni esemplari in un boschetto planiziale, sotto Populus.

MICROSCOPIA: spore 9-12,5 x 5-7 µm, da subfaseoliformi a ellissoidali. Basidi claviformi, tetrasporici.

BIBLIOGRAFIA : Funghi d'Italia Zanichelli a pag.362 al 1004.

DETERMINATORE Andrea Castellan

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



INOCYBE OBSOLETA



INOCYBE OBSOLETA



INOCYBE OBSOLETA



CHEILOCISTITI



SPORE

DESCRIZIONE

Inocybe obsoleta

Ordine: Agaricales

Famiglia: Inocybaceae

Genere: Inocybe

Specie: I. obsoleta

Sezione: Sezione Rimosae (Fr.) Quéf. Pileo conico, fibrilloso, presto fessurato radialmente.

Sinonimi: Inocybe rimosae var. obsoleta Quadr. & Lunghini.

Cappello: 30-60 mm di diametro, da conico-campanulato a conico-convesso, con umbone al disco; margine da involuto a orizzontale, rivestimento pileico asciutto, di colore ocre pallido, con fibrille radiali dorate, un po' lubrificato, sericeo, cosparso interamente da un velo bianco, feltroso, abbondante ed eccedente al margine.

Lamelle: arcuato-smarginate, uncinato, talvolta quasi libere, intercalate da lamellule, da grigio pallido, grigio-giallastro, ocreo, a bruno vivo, bruno sporco, con riflessi olivastri, filo lamellare finemente eroso, biancastro.

Carne: biancastra nel cappello, da biancastra a ocre chiaro e fibrosa nel gambo, odore molto debole, leggermente farinaceo alla sezione.

Gambo: 5-10 x 0,5-1 cm; cilindrico, slanciato, leggermente clavato alla base, bianco, superficie fibrillosa-sericea, pruinoso-fioccoso in alto, ocre-bruniccio con l'età e la manipolazione.

Spore: 9-12,5 x 5-7 µm, da subfaseoliformi a ellissoidali; basidi claviformi, tetrasporici; cheilocistidi cilindracei, clavati.

Habitat: estate-autunno; parchi e zone boschive, sotto aghifoglie e latifoglie.

Autore della scheda: Cds Gmc

Autore delle foto: Dino G. Cerantola