

SCHEDA N° 0146

ORDINE Russulales

GENERE <i>Lactarius</i>	SPECIE <i>L. acerrimus</i>	AUTORE Britzelmayr	
DATA DI RACCOLTA più date racc.	LUOGO DI RACC. colli di Possagno	COMUNE Possagno	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 450	I.G.M. III 083	RACCOGLITORE Franco Flavio Pinton	

HABITAT:

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: MISTO DI LATIFOGIE QUERCE-CARPINI-CASTAGNI | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Querce, Carpini, Castagni

NOTE: Stazioni di crescita di pochi esemplari gregari, in periodi diversi; in boschi termofili tra l'erba, 15-06/14-08/9-10/22-10

MICROSCOPIA: spore verrucoso-subreticolate, con basidi bisporigi, ampiamente ellissoidi, riunite da creste 11-14 × 9-10,5 µm

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia A.M.B. a pag. 852, Funghi d'Italia Zanichelli a pag 406 al 1124.

DETERMINATORE Cds Gmc

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



LACTARIUS ACERRIMUS




LACTARIUS ACERRIMUS




LACTARIUS ACERRIMUS



LACTARIUS ACERRIMUS



SPORE X 400



SPORE X 400

DESCRIZIONE

Lactarius acerrimus

Ordine: Russulales
Famiglia: Russulaceae
Genere: Lactarius
Specie: Acerrimus
Sezione: Zonarii

Cappello: Diametro da 5 a 15 cm. convesso-ombelicato irregolare, poi imbutiforme, margine involuto sottile, ondulato, di colore crema-giallastro, debolmente zonato marginalmente, cuticola un poco vischiosa, liscia, pruinosa e finemente feltrosa al bordo.

Lamelle: di colore rosato, ben spaziate fra loro, che presentano delle anastomosi nella zona di inserzione con il gambo, si macchiano di bruno nelle abrasioni.

Carne: soda, bianca immutabile, odore fruttato, secerne lattice dal sapore acre-bruciante.

Gambo: 2,5-4 x 1,5-2,5 cm, corto, tozzo, attenuato in basso, pieno, sodo, a volte eccentrico; pruinoso all'apice, il colore è biancastro-crema, con alcuni scrobicoli più o meno evidenti.

Spore: ampiamente ellissoidi con ornamentazioni alte sino 1,5 μm , di grosse dimensioni (11-14 \times 9-10,5 μm), riunite da creste, non reticolate, basidi clavati bisporici. Sporata beige-rosa.

Habitat: cresce in estate-autunno, in boschi termofili di latifoglie soprattutto Querce, Carpini e Castagni abbastanza frequente.

Autore della scheda: Cds Gmc

Autore delle foto: Franco Flavio Pinton