

**SCHEDA N° 0326**

**ORDINE Russulales**

<b>GENERE</b> Lactarius	<b>SPECIE</b> L. Atlanticus	<b>AUTORE</b> Bon 1975	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 13-12-2022	<b>LUOGO DI RACC.</b> Cà Marcello Levada	<b>COMUNE</b> Piombino Dese	<b>PROV.</b> PD
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 25	<b>I.G.M.</b> IV 127	<b>RACCOGLITORE</b> Dino G. Cerantola - Flavio F. Pinton	

**HABITAT:**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI                     | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA                              |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO            | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO                    | <input type="checkbox"/> ARENILE  |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA                | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A                 |   |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME         | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO                      | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO                                |
| <b>BOSCO DI:</b> PLANIZIALE DI LATIFOGLIE MISTE  |  | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO         | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO     | <input type="checkbox"/> IN RADURE                                      |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO                | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI  |

**ESPOSIZIONE:**

- ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

- ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:** Varie tipi di Latifoglie con Leccio

**NOTE:** Stazione di crescita gregaria, in gruppi più o meno numerosi, in spazi aperti erbosi, sotto Leccio

**MICROSCOPIA:** Spore 7.50-8.55 x 6.78-7.82 µm, subglobulose, verrucose

**BIBLIOGRAFIA:** Funghi d'Italia Zanichelli pag.420 al 1170- Funghi d'Italia AMB pag.871-Funghi in Italia Nicolò Oppicelli pag.212

**DETERMINATORE** G.M.C. Castellano C.D.S.

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**  FRESCHI  SECCHI



LACTARIUS ATLANTICUS



LACTARIUS ATLANTICUS



LACTARIUS ATLANTICUS



L. ATLANTICUS IMENIO E LATICE



LACTARIUS ATLANTICUS

## DESCRIZIONE

### **Lactarius Atlanticus**

**Ordine:** Russulales  
**Famiglia:** Russulaceae  
**Genere:** Lactarius  
**Specie:** L. Atlanticus

**Sezione:** Sezione >> Oletes Bataille - Basidiomi con superficie pileica oca-fulvastro, bruno scuro, carne con odore intenso, cimicino, di cicoria torrefatta; lattice bianco, immutabile.

**Sinonimi:** Lactarius atlanticus f. strigipes Bon.

**Cappello:** Da 3-7 cm; convesso da giovane, a piano, con leggero umbone, margine sottile, appena involuto, con un colore variabile dal giallo-rosato al fulvo mattone. La cuticola è liscia e glabra, secca e lucida, talvolta debolmente guttulata, non striata o zonata, ma più o meno rugolosa, grinzosa, pruinosa e spesso percorsa da screpolature concentriche.

**Lamelle:** Da adnate a subdecorrenti, decorrenti sul gambo, molto fitte e riccamente intercalate con lamellule, a volte anche intervenute; elastiche, il loro colore è ocraceo, ocraceo aranciato e si macchiano lentamente di color ruggine nei punti fratturati. Il filo, normalmente concolore, negli esemplari più vecchi può diventare color ruggine.

**Carne:** Cassante, non molto spessa ma soda, biancastra con tendenza ad arrossare al taglio, odore cimicino negli esemplari freschi, diventa odore di cicoria negli esemplari essiccati, sapore dapprima dolciastro, poi amarognolo e un poco astringente. Il lattice è scarso, sieroso, pressochè trasparente e immutabile, spesso anche praticamente assente in caso di tempo secco, biancastro, ingiallisce lentamente.

**Gambo:** Da 3-8 × 0,8-2 cm, cilindraceo, leggermente attenuato alla base, più o meno ricurvo, slanciato, tenace, concolore al cappello, ricoperto da una fine pruina bianca, più pallido all'apice, rosso-bruno alla base dove è presente una peluria bianca o biancastro-ocraceo-rosata.

**Spore:** 7.50 - 8.55 x 6.78 - 7.82 µm, subglobulose, verrucose. La sporata in massa è di colore crema scuro.

**Habitat:** Autunno - Inverno, boschi termofili misto latifoglie, comune sotto Leccio.

Autore della scheda: Bruno Cerantola.

Autore delle foto: Dino G. Cerantola.