

**SCHEDA N° 0147**

**ORDINE Russulales**

<b>GENERE</b> <i>Lactarius</i>	<b>SPECIE</b> <i>L. azonites</i>	<b>AUTORE</b> (Bull.) Fr.	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> da giug. a ott.	<b>LUOGO DI RACC.</b> colli di Possagno	<b>COMUNE</b> Possagno	<b>PROV.</b> TV
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> mt.400	<b>I.G.M.</b> III 083	<b>RACCOGLITORE</b> Franco Flavio Pinton	

**HABITAT:**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI     | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA          |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO          | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO    | <input type="checkbox"/> ARENILE                    |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA              | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A |   |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME       | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO      | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

**BOSCO DI :** MISTO LATIFOGIE QUERCUS-CASTANEA

RADO  FITTO

- |  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO     | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO        | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI                                 |

**ESPOSIZIONE:**

- ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

- ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :** Querce-Castagni

**NOTE :** stazione di crescita gregario con uno o più esemplari vicini, in boschi termofili di latifoglie 15-06/14-08/29-09/22-10

**MICROSCOPIA:** Spore sub-globose 8-9 x 7,5-8,5 µm, con verruche da coniche a coniche ottuse, collegate da reticolo.

**BIBLIOGRAFIA :** Funghi dal vero Cetto al 622, Funghi d'Italia Zanichelli a pag.424 al 1180. Funghi d'Italia A.M.B. vol 3 al n.1365

**DETERMINATORE** Cds Gmc

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**  FRESCHI  SECCHI



**LACTARIUS AZONITES**




**LACTARIUS AZONITES**




**LACTARIUS AZONITES**



**LACTARIUS AZONITES**



**SPORE X 400**



**SPORE X 400**

## DESCRIZIONE

Lactarius azonites

**Ordine:** Russulales

**Famiglia:** Russulaceae

**Genere:** Lactarius

**Specie:** Azonites

**Sottogenere:** Plinthogali (Burlingham) Hesler et A.H.

**Cappello:** 3-8 cm convesso poi appianato dai vari toni di grigio non uniforme, area marginale schiarita, alcune macchie rugginose, cuticola asciutta feltrata, privo di zonature.

**Lamelle:** adnate appena decorrenti, sottili e poco fitte, rare biforcazioni allo stipite, ocre pallide o giallognole, lamellule numerose alternate. Latice fluente bianco, poco dopo rosa salmone a contatto con le lamelle.

**Carne:** consistente gessosa, bianca al taglio ma vira al rosa, col tempo grigio ocre, odore lievemente fruttato e sapore più o meno acre.

Latice: abbondante, bianco immutabile se isolato, vira al salmone a contatto con la carne o altre parti di fungo, sapore dapprima mite, poi amaro.

**Gambo:** 3-7 x 0,5-1,5 cm irregolarmente cilindrico, biancastro, pruinoso o glabro, alla manipolazione tende a macchiarsi di rosa, poi diviene ocre, pieno, farcito, sodo.

**Spore:** sub-globose 8-9 x 7,5-8,5 µm, con verruche da coniche a coniche ottuse collegate da reticolo.

**Habitat:** in estate-autunno, cresce preferibilmente in boschi termofili, sotto Castagno e Quercia.

Autore della scheda: Cds Gmc

Autore delle foto: Franco Flavio Pinton