

COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



SCHEDA N° 0264		ORDINE Boletales
GENERE Leccinum	SPECIE L. melaneum	AUTORE (Smotl.) Pilát & Dermek
D ATA DI RACCOLTA 31/05/2021	LUOGO DI RACC. Parco cittadino	COMUNE Castelfranco Veneto PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 43	I.G.M. II 104	RACCOGLITORE Dino Cerantola e Flavio Pinton
HABITAT:		
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	TERRENO COLTIVATO A	
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: MISTO LATIFOGLIE		⊠ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ OMB	ROSA MEDIA
UMIDITA' DEL TERRENO	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMID	o ⊠ umido □ asciutto □ secco
VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:	Varie tipi di Latifoglie	
Note: Stazione di crescita di numerosi carpofori viciniori, sul prato di un giardino, con colorazioni tendente a bruno nerastro.		
MICROSCOPIA: spore gialle in massa con sfumature cannella, fusiformi, lisce, guttulate, 14-18 x 5-6 μm.		
BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia zanichelli pag. 500 al 1402		
DETERMINATORE Dino Ceranto	ola e Flavio Pinton	TUATI SU REPERTI X FRESCHI SECCHI
LECCINUM MELANEUM	LECCINUM MELANEU	Dino & Ceranicle LECCINUM MELANEUM
LECCINUM MELANEUM	Ding St. Oerenbla LECCINUM MELANEU	M



COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV

E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



DESCRIZIONE

Leccinum melaneum

Classe: Basidiomycetes
Ordine: Boletales
Famiglia: Boletaceae
Genere: Leccinum
Specie: Melaneum

Sezione: Scabra Smiith, Thiers et Watling

Sinonimi: Boletus scaber var. Melaneum (Smotl.)

Kromblolzia scabra f, melanea (Smotl.)

Cappello: 4-8 cm. Arrotondato-emisferico, poi convesso, superfice vellutato-feltrata, vischiosa a tempo umido, bruno-nerastro,

margine debordante, più chiaro.

Tuboli: Lunghi, arrotondati al gambo, bianchi, col tempo crema a grigio-ocraceo

Carne: Bianca, biancastra legermente rosata in alto, odore e sapore gradevole.

Gambo: 5-8 cm. Cilindrico con base ingrossata, robusto, bianco ricoperto da scaglie appuntite bruno-neraste, distanziate tra loro.

Spore: Gialle in massa con sfumature cannella, fusiformi, lisce, guttulate, 14-18 x 5-6 μm.

Habitat: Estate – Autunno nei boschi di latifoglie soprattutto betulle.

Autore della scheda: Cerantola Bruno

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola