

SCHEDA N° 0152

ORDINE Boletales

GENERE <i>Leccinum</i>	SPECIE <i>L. pseudoscabrum</i>	AUTORE (Kallenb.) Šutara	
DATA DI RACCOLTA 19-06-12	LUOGO DI RACC. Colli di Possagno	COMUNE Possagno	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 400	I.G.M. II 083	RACCOGLITORE Dino Giuseppe Cerantola	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: MISTO LATIFOGLIA		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Castagno ,Carpino, Nocciolo

NOTE: Può essere confuso con il *Leccinum Scaber* ,si differenzia dalla carne che non annerisce al taglio.

MICROSCOPIA: Spore: 11-17 x 5-7 micron, fusiformi, lisce.

BIBLIOGRAFIA: AMB Vol. 1 - pag. 390 - Zanichelli pag. 504 al 1415

DETERMINATORE Dino Giuseppe Cerantola

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



LECCINUM PSEUDOS CABRUM



LECCINUM PSEUDOS CABRUM




LECCINUM PSEUDOS CABRUM



LECCINUM PSEUDOS CABRUM



LECCINUM PSEUDOS CABRUM



SPORATA OLIVA

DESCRIZIONE

Leccinum pseudoscabrum

Classe: Basidiomycetes

Ordine: Boletales

Famiglia: Boletaceae

Genere: *Leccinum*

Specie: *L. pseudoscabrum*

Cappello: di dimensioni variabili tra 3 e 15 cm, inizialmente emisferico-campanulato, poi convesso con margine spesso eccedente e con presenza di grinze e avvallamenti.

Gambo: tipicamente decorato con aculei nerastri.

Carne: Soda solo negli esemplari più giovani ma diventerà presto molle nel cappello e fibroso-coriacea nel gambo, di colore biancastro sporco che vira alla sezione rosato, poi grigio-violaceo e infine grigio-nerastro; odore debole, sapore leggero, dolciastro.

Spore: 11-17 x 5-7 micron, fusiformi, lisce.

Autore della scheda: Dino Giuseppe Cerantola

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola