

SCHEDA N° 0112

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Lepista</i>	SPECIE <i>L. irina</i>	AUTORE (Fr.) H.E. Bigelow	
DATA DI RACCOLTA 05/07/2014	LUOGO DI RACC. prati Malga Montegal	COMUNE Limana	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. mt.950	I.G.M. II 063	RACCOGLITORE Pinton Franco Flavio	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: ABETE ROSSO | | |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: pecceta pura

NOTE: stazione di crescita di pochi esemplari cresciuti al margine di un bosco di abete rosso tra l'erba, in prossimità di una betulla

MICROSCOPIA: spore più o meno lungamente ellissoidali, finemente verrucose o quasi lisce, 7-9 x 4-5 micron

BIBLIOGRAFIA: Funghi D'Italia A.M.B. G.Consiglio C. Papetti vol. 3 pag.1074 - Funghi D'Italia Zanichelli pag.166 al n°411

DETERMINATORE Franco Flavio Pinton

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI




LEPISTA IRINA




LEPISTA IRINA




LEPISTA IRINA



BASIDIOLI E SPORE



SPORE



SPORE

DESCRIZIONE

Lepista irina

Ordine: Agaricales

Famiglia: Agaricaceae

Genere: Lepista

Specie: irina

Sottogenerene: Rhodopaxillus (Maire) Bon Basidiomi tricolomoidi

Cappello: da 5-12 cm. emisferico, convesso, appianato, con largo umbone, igrofano, cuticola liscia, di colore biancastro, biancastro-crema con tempo secco, con tempo umido carnicino, bruno-carnicino, bruno-rosato, margine lungamente involuto poi incurvato verso il basso, infine disteso, da regolare a ondulato.

Lamelle: arrotondate al gambo, da subdecurrenti, fitte, facilmente separabili dalla carne, intercalate da lamellule, di colore crema-biancastre, poi carnicine, infine bruno-rosate, filo lamellare finemente crenulato.

Carne: biancastra soda nel cappello, fibrosa e brunastra alla base del gambo. odore aromatico, di fiori d'arancio, o radici d'iris. Sapore: dolciastro, sgradevole.

Gambo: da 5-12 cm. cilindrico, da claviforme, a subclaviforme robusto, pieno, poi cavo, fibrilloso-striato longitudinalmente, di colore biancastro e pruinoso in alto, concolore al cappello in basso.

Spore: più o meno lungamente ellissoidali, finemente verrucose o quasi lisce, 7-9 x 4-5 micron.

Habitat: in autunno gregaria, talvolta subcespitosa, in boschi di latifolia e di conifere. in prati e pascoli montani, specialmente su terreni calcarei.

Autore della scheda: c.d.s. Gruppo Micologico Castellano.

Autore delle foto: Franco Flavio Pinton.