

COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



Scheda n° 0330		ORDINE Agaricales
GENERE Lepista SP	PECIE L. Panaeolus	AUTORE (Fr.) P. Karst.
DATA DI RACCOLTA 13/12/2022 LU	UOGO DI RACC. Cà Marcello Levada COMU	NE Piombino Dese PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 25	G.M. IV 127	OGLITORE Dino G. Cerantola - Flavio F. Pinton
HABITAT:		
□ PRATI ERBOSI     □	ORTI E GIARDINI	MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
TORBIERA	TERRENO COLTIVATO A	
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: MISTO PLANIZIALE DI LA	_	RADO FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
SU LEGNO	□ VIVO □ MORTO DI	
ESPOSIZIONE:	ASSOLATA OMBROSA	MEDIA
UMIDITA' DEL TERRENO ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO  VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Misto di latifoglie e altri arbusti		
Note: Stazione di crescita gregaria di pochi esemplari, fra l'erba e fogliame in prossimità di carpini		
MICROSCOPIA: Spore: 6-7 x 3,5-4 micron, ellissoidali, ialine, sporata color rosato		
BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag. 166 al 413 Funghi d'talia A.M.B vol. 2 pag. 605		
DETERMINATORE Dino G.Cerantola -Flavio Pinton  RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI   FRESCHI   SECCHI		
Dino G. Cerantola  LEPISTA PANAEOLUS	LEPISTA PANAEOLUS -CUTIS-	LEPISTA PANAEOLUS
Dino G. Cerantola LEPISTA PANAEOLUS IMENIO	Dine G. Ceranto LEPISTA PANAEOLUS	



## COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV

E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



## **DESCRIZIONE**

Lepista Panaeolus

Ordine: Agaricales Famiglia: Tricolomataceae

Genere: Lepista Specie: L. Panaeolus

Sezione: Sottogenere >> Rhodopaxillus (Maire) Bon - Basidiomi tricolomoidi, pigmento parietale dominante

Sinonimi: Agaricus panaeolus p., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 49 (1838) [1836-1838]

Gyrophila panaeolus (Fr.) Quél., Enchir. fungo. (Parigi): 17 (1886)

Tricholoma panaeolus (Fr.) Quél., Mém. soc. Émul. Montbéliard, Ser. 25:82 (1872)

Rhodopaxillus panaeolus (Fr.) Maire, Annls mycol. 11 (4): 338 (1913)

Paxillopsis prunulus (Scop.) J.E. Lange

Cappello: 5-10 cm, da convesso, piano-convesso, talora con basso umbone centrale, margine involuto, cuticola liscia grigio-

brunastro, con presenza di pruina sulla superficie del cappello.

Lamelle: Concolori al cappello, con tendenza ad imbrunire con l'età, abbastanza fitte, alte, sottili, leggermente decorrenti.

Carne: Di colore biancastro o grigio chiaro, di consistenza un po' fragile, soprattutto nel cappello, un po' più fibrosa nel piede.

Ha un odore leggermente farinoso, sapore dolciastro.

Gambo: 5-14 x 2-3,5 cm, cilindrico, più o meno clavato, pieno, glabro, concolore più chiaro del cappello.

Spore: Misurano 6-7 x 3,5-4 micron, ellissoidali, ialine, finemente verrucose, sporata di colore rosato.

Habitat: in autunno, anche inoltrato, raramente in primavera, gregario di latifoglie, più raro sotto aghifoglie. Molto comune.

Autore della scheda: Bruno Cerantola Cds Gmc

Autore delle foto: Dino G. Cerantola