

SCHEDA N° 0305

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Lepista</i>	SPECIE <i>L.sordida</i> var. <i>lilacea</i>	AUTORE (Quél.) Bon	
DATA DI RACCOLTA 22-11-2021	LUOGO DI RACC. Cà Marcello Levada	COMUNE Piombino Dese	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 25	I.G.M. IV 127	RACCOGLITORE Dino G. Cerantola - Flavio F. Pinton	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: PLANIZIALE DI VARIE ESSENZE DI LATIFOGIE		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: in prossimità di siepi di latifoglie varie

NOTE: una singola stazione di crescita gregaria, su un sentiero tra l'erba e detriti legnosi e foglie marcescenti di latifoglie

MICROSCOPIA: Spore: 6-8 x 4-5 ulm, ellissoidali, leggermente verrucose, in massa rosa salmone

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag.166 al n°416 Bruno Cetto vol. 2 pag. 321 al n°585

DETERMINATORE Dino G. Cerantola - F. F. Pinton

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



LEPISTA SORDIDA V. LILACEA



LEPISTA SORDIDA V. LILACEA



LEPISTA SORDIDA V. LILACEA



L. SORDIDA V. LILACEA IMENIO

DESCRIZIONE

Lepista sordida v. lilacea

Ordine: Agaricales
Famiglia: Agaricaceae
Genere: Lepista
Specie: L. sordida v. lilacea

Sezione: Sottogenere >>Rhodopaxillus (Maire) Bon - Basidiomi tricolomoidi, pigmento parietale dominante.

Sinonimi: Agaricus sordidus Schumach., Enum. pl. (Kjbenhavn) 2: 341 (1803)
Gyrophila nuda var. lilacea Quél., Fl. mycol. France (Paris): 271 (1888)
Gyrophila sordida (Schumach.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 18 (1886)
Lepista domestica Murrill, Mycologia 7(2): 106 (1915)
Lepista nuda var. sordida (Schumach.) Maire, Étude synth. genre Tricholoma (1916)
Lepista sordida var. aianthina (Bon) Bon, Docums Mycol. 10(nos 37-38): 91 (1980) [1979]

Cappello: 4-9 cm, dapprima convesso, infine spianato-depresso, spesso con largo umbone al centro, margine inizialmente carnoso e lungamente involuto; superficie liscia, untuosa con l'umido, igrofana, con riflessi lilacini, talvolta interamente violetta.

Lamelle: adnato-smarginate o appena decorrenti sul gambo, fitte, larghe; biancastre, poi con tonalità lilacino-violetto.

Carne: dapprima tenace, un po' elastica, presto fragile e spesso intrisa d'acqua nel cappello e fibrosa nel gambo; colore biancastro poi grigio-lilla, ha odore terroso-ammuffito.

Gambo: 40-80 X 6-15 mm, pieno, poi farcito, cilindrico, spesso leggermente incurvato, ingrossato alla base; corteccia fibrilloso-striata di colore dapprima grigio-lilla, poi al violetto, violetto brunastro; base con feltro biancastro.

Spore: 6-8 x 4-5 um, ellissoidali, leggermente verrucose, in massa rosa salmone.

Habitat: in zone erbose, soprattutto in giardini, parchi; gregaria non cespitosaa; generalmente in tardo autunno-inverno o anche in primavera.

Autore della scheda: Flavio F. Pinton Cds. gmc.

Autore delle foto: Dino G. Cerantola Cds. gmc.