

SCHEDA N° 0211

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Leucoagaricus</i>	SPECIE <i>L. cinerascens</i>	AUTORE (Quél.) Bon et Boiffard	
DATA DI RACCOLTA 16/09/2017	LUOGO DI RACC. parco locale	COMUNE Vedelago	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 25	I.G.M. II 104	RACCOGLITORE Franco Flavio Pinton	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input checked="" type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: LATIFOGLIE MISTE TERMOFILO | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Quercus-Ontano-Populus

NOTE: Stazione di crescita di più esemplari singoli o gregari, in giorni diversi, tra l'erba su terreno molto umido

MICROSCOPIA: Spore ovoidali; 7-9 x 5-6 μ

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli a pag. 92 al n. 192

DETERMINATORE Franco Flavio Pinton

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



LEUCOAGARICUS CINERASCENS



LEUCOAGARICUS CINERASCENS



LEUCOAGARICUS CINERASCENS



LEUCOAGARICUS CINERASCENS



LEUCOAGARICUS CINERASCENS

DESCRIZIONE

Leucoagaricus cinerascens

Ordine: Agaricales

Famiglia: Agaricaceae

Genere: Agaricus

Specie: cinerascens

Sezione: Annulati (Fr.) Bon - Basidiomi robusti, cespitosi e non, carne arossante o immutabile; spore con poro germinativo e medulla metacromatica.

Sinonimi: Agaricus aithopus Holmsk., Beata Ruris Otia FUNGIS DANICIS 2: 69, tab. 41 (1799)
Agaricus cinerascens Batsch, Elench. fung. (Halle): 125, tab. 19, fig. 101 (1786).
Lepiota cinerascens Quéf.

Cappello: da 4-8 cm; da conico-campanulato a piano-convesso con umbone ± accentuato; superficie liscia, unita, grigiastro, grigio-cenero, poi, a partire dal margine, radialmente lacerata in piccole squame appressate.

Lamelle: libere, piuttosto fitte, dapprima bianche, poi progressivamente grigio-rosate, Anello: membranoso, bianco, caduco.

Carne: bianca, poco o per nulla ingiallente; inodore ed insapore.

Gambo: 5-10 x 1-1,5 cm; subcilindrico, ± bulboso, liscio, bianco con tendenza a macchiarsi di bruno-giallastro alla manipolazione.

Spore: ovoidali; ellissoidale, lisce, ialine, destrinoide, metacromatiche, a pareti spesse, con poro germinativo, 7-8 (10) x 5-6- (6.5) µm. Basidi clavati, 28-40 x 8-10 µm, tetrasporici, senza cappuccio. Cheilocistidi clavati, fusiformi, 45-55 x 10-16 µm. Cuticola composta da ife irregolarmente impigliate, cellule terminali 30-95 x 9-15 µm, pigmentazione bruna; Spore bianche.

Habitat: estate-autunno, in ambiente mediterraneo, in suoli sabbiosi sotto varie essenze. Raro. Non comm.

Autore della scheda: Franco Flavio Pinton

Autore delle foto: Franco Flavio Pinton