

SCHEDA N° 204

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Leucoagaricus</i>	SPECIE <i>L. leucothites</i>	AUTORE (Vittad.) Wasser	
DATA DI RACCOLTA 11-09-2017	LUOGO DI RACC. Parco cittadino	COMUNE Castelfranco V.to	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 43 mt.	I.G.M. II 104	RACCOGLITORE Dino G. Cerantola	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input checked="" type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: PIANURA | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Latifoglie miste

NOTE: Stazione di crescita gregaria, di esemplari fra l'erba di un parco cittadino, in ambiente molto umido.

MICROSCOPIA: spore 8,5-10 x 5-6 µm, ellittiche, bianche, leggermente rosate in massa.

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia A.M.B vol 1 a pag 264, Funghi d'Italia Zanichelli a pag 92 al 190.

DETERMINATORE Cds GMC

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



LEUCOAGARICUS LEUCOTHITES



LEUCOAGARICUS LEUCOTHITES2



LEUCOAGARICUS LEUCOTHITES3



LEUCOAGARICUS LEUCOTHITES



LEUCOAGARICUS LEUCOTHITES



LEUCOAGARICUS LEUCOTHITES

DESCRIZIONE

Leucoagaricus leucothites

Ordine: Agaricales

Famiglia: Agaricaceae

Genere: Leucoagaricus

Specie: leucothites

Sezione: Annulati : (Fr.) Bon. - specie robuste e non, carne arrossante o immutabile. spore con poro germinativo.

Sinonimi: Agaricus leucothites Vittad.

Lepiota naucina (Fr.) P. Kumm.

Lepiota leucothites (Vittad.) P.D. Orton

Cappello: 4-10 cm di diametro, carnoso, prima ovoidale, poi emisferico-convesso, fino ad appianato-arrotondato, con o senza largo umbone ottuso, margine un po' debordante, appendicolato da resti di velo biancastri; cuticola prima liscia, bianca, poi fibrillosa e debolmente ocracea al centro.

Lamelle: libere al gambo, fitte, larghe e ventricose, con numerose lamellule, prima di colore bianco, poi crema-roseo carnicino a maturità.

Carne: soda e poi tenera, fibrosa nel gambo; di colore bianco, immutabile; odore fungino gradevole e sapore dolce

Gambo: 5-8 x 1-2 cm, cilindrico, concolore al cappello, robusto e slanciato, presto cavo, un poco fibrilloso, bulboso e spesso ricurvo alla base, provvisto di un sottile anello membranoso bianco, pendulo e a volte fugace.

Spore: 8,5-10 x 5-6 µm, ellittiche, con poro germinativo, bianche, leggermente rosate in massa.

Habitat: specie gregaria molto comune, fruttifica dalla primavera fino al tardo autunno, frequente nei terreni coltivati e nelle zone erbose, al margine di strade, di boschi, in parchi e giardini.

Autore della scheda: Cds GMC

Autore delle foto: Dino G. Cerantola