

SCHEDA N° 0301

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Leucogarius</i>	SPECIE <i>L. serenus</i>	AUTORE (Fr.) Bon & Boiffard,	
DATA DI RACCOLTA 02-12-021	LUOGO DI RACC. Cà Marcello Levada	COMUNE Piombino Dese	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 25	I.G.M. IV 127	RACCOGLITORE Dino G. Cerantola - Flavio F. Pinton	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: PLANIZIALE MISTO AGHI-LATIFOGIE | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: boschetto di aghi-latifoglie in vicinanza di bambù

NOTE: stazione di crescita di un singolo esemplare sotto boschetto di latifoglie in prevalenza bambù

MICROSCOPIA: Spore: 7,5 - 9 x 4,5-5,5 um assenza di cistidi

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag.92 al n°193 funghi dal vero Bruno Cetto vol.6 pag.35 al n°2165

DETERMINATORE Dino Cerantola - Flavio Pinton

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



LEUCOAGARICUS SERENUS




LEUCOAGARICUS SERENUS IMENIO




LEUCOAGARICUS SERENUS



SPORE E BASIDI



SPORE



CISTIDI

DESCRIZIONE

Leucoagaricus serenus

Ordine: Agaricales
Famiglia: Agaricaceae
Genere: Leucoagaricus
Specie: L. serenus

Sezione: >> Sericelli (KUhner.) Bon et Boiffard - Basidiomi slanciati, ± esili e fragili, rivestimento sericeo, di colore bianco, pileipellis a elementi disposti parallelamente; spore ovoidali-ellissoidali, senza poro germinativo.

Sinonimi: Agaricus serenus Fr., Hymenomyc. eur. (Upsaliae): 38 (1874)
Lepiota serena (Fr.) Sacc., Bull. Soc. bot. Fr. 26: 45 (1880) [1879]
Mastocephalus serenus (Fr.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 860 (1891)
Pseudobaeospora serena (Fr.) Locq., Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 68: 169 (1952)
Sericeomyces serenus (Fr.) Heinem., Bull. Jard. Bot. natn. Belg. 48(3-4): 403 (1978)

Capello: 3-4 cm; da campanulato a pianeggiante con umbone ottuso; superficie unita, liscia, bianco-candido, sfumata di crema al centro, fibrillosa al margine.

Lamelle: bianche, poi crema.

Carne: esigua, bianca, immutabile, inodore ed insapore.

Gambo: da 4- 8 - x 0,4-0,8 cm; subcilindrico, talvolta con base claviforme o bulbillosa, bianco e sericeo.
Anello: semplice ± ampio, persistente.

Spore: 7,5 - 9 x 4,5-5,5 um assenza di cistidi.

Habitat: estate-autunno, in ambiente mediterraneo, in suoli sabbiosi sotto varie essenze. Raro.

Autore della scheda: Flavio F. Pinton Cds. gmc

Autore delle foto: Dino G. Cerantola