

SCHEDA N° 0157

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Lyophyllum</i>	SPECIE <i>L. loricatum</i>	AUTORE (Fr.) Kühner	
DATA DI RACCOLTA 6/11/2015	LUOGO DI RACC. parco cittadino	COMUNE Castelfranco V.to	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 44	I.G.M. II 104	RACCOGLITORE Franco Flavio Pinton	

HABITAT:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATERBOSI | <input checked="" type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DI UNA SIEPE DI PSEUDO-LAURO |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI : GIARDINO CON LATIFOGLIE VARIE, PSEUDO-LAURO | | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : alberelli di Faggio, Aceri, Carpini.

NOTE : Stazione di crescita cespitosa di numerosi esemplari interrati, in tardo autunno sul prato in vicinanza di pseudo-lauro

MICROSCOPIA: Spore globose, 5,5-6,4 µm. molte con grossa guttula centrale, giunti a fibbia abbondanti.

BIBLIOGRAFIA : Funghi d'Italia A.M.B. Vol. 2 - pag. 614 - Funghi d'Italia Zanichelli pag. 182 al 468

DETERMINATORE Franco Flavio Pinton

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



LYOPHYLLUM LORICATUM




LYOPHYLLUM LORICATUM




LYOPHYLLUM LORICATUM



LYOPHYLLUM LORICATUM



SPORE IN MASSA



CHEILOCISTITI

DESCRIZIONE

Lyophyllum loricatum

Ordine: Agaricales
Famiglia: Tricholomataceae
Genere: *Lyophyllum loricatum*
Specie: *L. loricatum*
Sezione: *Difformia* (Fr.) Kühner

Cappello: Diametro 4-12 cm, di consistenza tenace cartilaginosa, inizialmente globoso, lungamente convesso, poi piano-convesso, nella parte centrale si nota un basso umbone, poi con la crescita anche depresso, igrofano, di colore da marrone scuro a castano abbastanza omogeneo. La cuticola è glabra, untuosa, leggermente fibrillosa, non pruinoso, elastica-cartilaginea. Il margine è intero, involuto, con andamento sinuoso, ondulato.

Lamelle: Smarginate, adnate, anche un po' decorrenti, spesse, mediamente spaziate, biancastre crema pallide, intercalate da lamellule di varie dimensioni, ingiallenti al tocco, ed in vecchiaia, ma non annerenti.

Carne: Ha una consistenza dura e cartilaginea, biancastra, elastica, ingridente al taglio, odore sub-farinoso erbaceo, sapore dolce.

Gambo: Cilindrico, tenace, centrale, striato, di colore grigiastro-brunastro, più chiaro del cappello, da sinuoso a ritorto, influenzato dalle condizioni di crescita, spesso molto interrato e cespitoso.

Spore: Ialine, globose, 5,5-6,4 µm. molte con grossa guttula centrale, giunti a fibbia abbondanti.

Habitat: cresce tipicamente gregario e cespitoso e abbastanza interrato, ma anche singolo con esemplari notevolmente di grandi dimensioni, fine estate-autunno; campioni rinvenuti in un prato di un giardino sotto essenze varie di Latifoglie.

Autore della scheda: Dino Giuseppe Cerantola

Autore delle foto: Franco Flavio Pinton