

SCHEDA N° 0118

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Melanoleuca</i>	SPECIE <i>M. leucophylloides</i>	AUTORE (Bon) Bon	
DATA DI RACCOLTA 11-11-2014	LUOGO DI RACC. giardino privato	COMUNE Castelfranco V.to	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 30	I.G.M. II 104	RACCOGLITORE GMC Castellano	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input checked="" type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| BOSCO DI : | | |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : in presenza di un acero vetusto

NOTE : stazione di crescita di soli 4 esemplari in semicerchio

MICROSCOPIA: spore da subglobose-elissoidali 7-8 x (4,5) 5-6µ con plaga ilare evidente, verrucose amiloidi, cistidi utriformi rari

BIBLIOGRAFIA : A.M.B. funghi d'Italia vol. 3 pag.1084

DETERMINATORE Gmc Castellano

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



MELANOLEUCA LEUCOPHYLLOIDES




MELANOLEUCA LEUCOPHYLLOIDES



MELANOLEUCA LEUCOPHYLLOIDES



SPORE



CISTIDIO A PELO D'ORTICA



BASIDIO TETRASPORICO E SPORE

DESCRIZIONE

Melanoleuca leucophylloides

Ordine: Agaricales
Famiglia: Tricholomataceae
Genere: Melanoleuca
Specie: leucophylloides
Sottogenere: urticocystis
Sezione: Grammopodiae

Cappello: da 25-35 mm, all'inizio convesso, quindi spianato, infine depresso e con largo e basso umbone centrale, leggermente vischiosetto con l'umido, lievemente igrofano, di colore nocciola-brunastro, anche macchiato di nerastro a zone, margine più chiaro, orlo intero, eccedente le lamelle per 1-2 mm, segnato di bianco.

Lamelle: piuttosto fitte, smarginate con dentino, sinuosette, leggermente ondulate, alte due volte lo spessore della carne pileica, di colore biancastro, filo lamellare intero, concolore alle facce.

Carne: scarsa nel cappello, biancastra. Odore e sapore deboli un pò erbaceo.

Gambo: 30-60 x 3-5 mm, tendenzialmente cilindrico o solo leggermente più largo alla base, anche leggermente svasato nella parte superiore, striato longitudinalmente, decorato da fibrille biancastre e cosparso da fine pruina bianca su uno sfondo concolore al pileo.

Spore: da 7-8 x 5-6 µm. subglobose a obovoidali, con plaga ilare evidente, verrucose amiloidi, cistidi utriformi rari con verruche isolate.

Habitat: Tra l'erba di prati e pascoli zone rurali, in autunno anche inoltrato.

Autore della scheda: GMC Castellano

Autore delle foto: Franco Flavio Pinton