

SCHEDA N° 0171

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Melanoleuca</i>	SPECIE <i>M. verrucipes</i>	AUTORE (Fr. Quél.) Singer	
DATA DI RACCOLTA 17-09-2016	LUOGO DI RACC. Cermis	COMUNE Cavalese	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200 mt.	I.G.M. III 044	RACCOLTITORE Mowlazadeh Mark	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input checked="" type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI : MISTO AGHIFOGLIA E LATIFOGLIA

RADO FITTO

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Picea abies e Fagus.

NOTE : gregaria, in pochi esemplari tra l'erba, ai lati di un sentiero al margine del bosco. figura 2/3 raccolta il 25/05/016 a Possagno

MICROSCOPIA: Spore 7-10 x 4,5-5,5 µm, ellissoidali, finemente verrucose, ialine; pleurocistidi a pelo d'ortica.

BIBLIOGRAFIA : Funghi d'Italia Zanichelli a pag.170 al 429 – Funghi d'Italia A.M.B. vol.2 a pag.612

DETERMINATORE Cds Gmc

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



MELANOLEUCA VERRUCIPES



MELANOLEUCA VERRUCIPES 2



MELANOLEUCA VERRUCIPES 3



MELANOLEUCA VERRUCIPES 4



CHEILOCISTIDI



SPORE

DESCRIZIONE

Melanoleuca verrucipes

Ordine: Agaricales
Famiglia: Tricholomataceae
Genere: Melanoleuca
Specie: Verrucipes
Sezione: Alboflavidae

Cappello: 4-10 cm, dapprima convesso, poi piano-convesso, alla fine un po' imbutiforme con un leggero umbone centrale, margine sottile e poco ondulato. Colore bianco o biancastro e con disco brunastro, leggermente igrofano, cuticola liscia e sericea, ma che si screpola con il secco.

Lamelle: fitte, da adnate a decorrenti per un dentino, mediamente alte, bianche all'inizio, per poi prendere riflessi incarnato-rosacei a maturità.

Carne: bianca, tenera nel cappello, tenace e fibrosa invece quella del gambo, odore fruttato complesso o appena farinoso e sapore mite.

Gambo: 5-10 x 0.5-1.2 cm, cilindrico o leggermente ingrossato alla base, caratterizzato da minute scagliosità nerastre su fondo biancastro per tutta la sua lunghezza. Base spesso rivestita da un feltro biancastro. Nei giovani esemplari il gambo è slanciato e decisamente sproporzionato in altezza rispetto al diametro del cappello.

Spore: 7-10 x 4,5-5,5 µm, ellissoidali, finemente verrucose, ialine; pleurocistidi a pelo d'ortica.

Habitat: cresce singola o gregaria, dall'inizio dell'estate fino a tutto l'autunno, isolata o in piccoli gruppi, al margine dei boschi, nei prati e nei pascoli montani.

Autore della scheda: Pellizzari Renato

Autore delle foto: Pinton Franco Flavio