

SCHEDA N° 0030

ORDINE GASTEROMICETI

| | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| GENERE MYRIOSTOMA | SPECIE M. COLIFORME | AUTORE (DIKS.) CORDA | |
| DATA DI RACCOLTA 5-5-2010 | LUOGO DI RACC. PARCO BOLASCO | COMUNE CASTELFRANCO V. | PROV. TV |
| ALTITUDINE S.L.M. 44 | I.G.M. II 104 | RACCOGLITORE MERKUS TERESA | |

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
- BOSCO DI: AGHI -LATIFOLIA
- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI <input type="checkbox"/> CEDRUS, CARPINUS, POPULUS |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : AGHI -LATIFOLIA

NOTE : Periodi di ritrovamento 5 maggio, 10-20 giugno, 15-20 luglio.

MICROSCOPIA:

BIBLIOGRAFIA : Zanichelli funghi d'italia pag.544 al 1522 - A.M.B. funghi d'italia vol. 2 pag. 950 -

DETERMINATORE MERKUS TERESA

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



MYRIOSTOMA COLIFORME_1



MYRIOSTOMA COLIFORME_2



MYRIOSTOMA COLIFORME_3



MYRIOSTOMA COLIFORME_4



MYRIOSTOMA COLIFORME_5



MYRIOSTOMA COLIFORME_6

DESCRIZIONE

Basidioma. chiuso da 3-8 cm. aperto da 6-12 cm. peridio doppio.

Endoperidio: con diametro sino a 7 cm, sferico o appiattito, sostenuto da numerosi pseudogambi lunghi 3-5 mm, con ostioli in numero variabile da 3 a 50, non prominenti.

Esoperidio: a 3 strati, a maturità aperto a stella con 4-14 lacinie, diametro sino a 15 cm, colore da nocciola a bruno cupo a maturità per il deposito sporale.

Gleba: inizialmente bianca per poi polverizzarsi e diventare marrone, costituita da numerose columelle (una per ogni peduncolo) spesso ramificate e lunghe fino a metà altezza.

Sapore ed odore non particolari.

Autore della scheda. MERKUS TERESA

Autore delle foto - Pinton Franco Flavio