

SCHEDA N° 0240

ORDINE Polyporales

GENERE Panus	SPECIE P. neostrigosus	AUTORE Drechsler-Santos & Wartchow	
DATA DI RACCOLTA 09/11/2019	LUOGO DI RACC. Bosco Nordio	COMUNE Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 5 mt	I.G.M. 048 I	RACCOGLITORE Cds G.M.C.	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: PLANIZIALE DI LATIFOGLIA E AGHIFOGLIA		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE
<input checked="" type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input checked="" type="checkbox"/> MORTO	DI POPULUS NIGRA

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Pinus, Populus nigra, Quercus ilex e Quercus robur.

NOTE: alcuni esemplari su tronchi tagliati di Populus nigra.

MICROSCOPIA: spore 4-5,5 x 1,5-2 µm, ialine, ellissoidali, lisce, non amiloidi.

BIBLIOGRAFIA: estratto dal sito Web MushroomExpert.Com : http://www.mushroomexpert.com/panus_neostrigosus.html

DETERMINATORE Cds G.M.C.

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



PANUS NEOSTRIGOSUS 1



PANUS NEOSTRIGOSUS 2



PANUS NEOSTRIGOSUS 3



PANUS NEOSTRIGOSUS 4



PANUS NEOSTRIGOSUS 5



PANUS NEOSTRIGOSUS 6

DESCRIZIONE

Panus neostrigosus

Ordine: Polyporales
Famiglia: Polyporaceae
Genere: *Panus*
Specie: *P. neostrigosus*
Sezione: -

Sinonimi: *Agaricus strigosus* Schwein.,
Lentinus strigosus Fr.,
Agaricus crinitus Schwein.,
Lentinus lecomtei Fr.,

Cappello: 2-6 cm di diametro, a forma di conchiglia o ventaglio, imbutiforme. Cuticola densamente coperta da peli grossolani, corti e fitti, tanto da sembrare vellutata, color carneo-lilacino nel giovane poi carnicino, giallo-ocra a maturità. Margine involuto nei giovani esemplari, poi ondulato-lobato, anch'esso ricoperto da fitta peluria.

Lamelle: fitte, molto decorrenti con filo lamellare seghettato, con lamellule, inizialmente biancastre-violacee poi crema - giallo ocra.

Carne: abbastanza coriacea e fibrosa, biancastra, immutabile, odore debole fungino, sapore non caratteristico o talvolta amaro.

Gambo: 1-2 cm di lunghezza, corto, a volte quasi assente, spesso decentrato o laterale, allargato verso la base, tenace, densamente peloso, inizialmente bianco-violaceo, poi giallo-ocraceo, concolore al cappello.

Spore: 4-5,5 x 1,5-2 µm, ialine, ellissoidali, lisce, non amiloidi. Basidi slanciati, clavati, tetrasporici. Pleurocistidi e cheilocisti clavati, cilindrici, allungati; giunti a fibbia presenti.

Habitat: fungo saprofito, su ceppaie di latifoglia recentemente morte e non ancora marcescenti, in gruppi, dalla primavera all'autunno.

Autore della scheda: Pellizzari Renato

Autore delle foto: Dino G. Cerantola