

SCHEDA N° 0309

ORDINE Agaricales

GENERE Paralepista	SPECIE P. flaccida	AUTORE (Sowerby) Vizzini	
DATA DI RACCOLTA 22-11-2021	LUOGO DI RACC. Cà Marcello Levada	COMUNE Piombino Dese	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 25	I.G.M. IV 127	RACCOGLITORE Dino G. Cerantola - Flavio F. Pinton	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: PLANIZIALE DI LATIFOGLIE MISTE PREVALENZA CARPINI | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: boschetto di latifoglie con prevalenza bamboo

NOTE: Singola stazione di crescita gregaria, su terreno con foglie marcescenti ai margini di un boschetto di bamboo

MICROSCOPIA: Spore: 3-5 x 3,5-4,5 um, subglobose, finemente verrucose

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag.164 al n°408 R.Courtecuisse pag.174 al n°287 rigo 4 sub

DETERMINATORE Dino Cerantola - Flavio Pinton

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



© Dino G. Cerantola
PARALEPISTA FLACCIDA



© Dino G. Cerantola
PARALEPISTA FLACCIDA



© Dino G. Cerantola
PARALEPISTA FLACCIDA



© Dino G. Cerantola
PARALEPISTA FLACCIDA IMENIO

DESCRIZIONE

Paralepista flaccida

Ordine: Agaricales
Famiglia: Agaricaceae
Genere: Paralepista
Specie: P.flaccida

Sezione: Sottogenere >>Paralepista (Raith.) Bon incl. Sottogenere Lepista Fr. (= sez. Spongiosae Fr.)
Basidiomi ± clitociboidi, sporata bianca o crema-rosato, pigmento ± intracellulare. Spore finemente ornamentate.

Sinonimi: Omphalia flaccida (Sowerby) Quél., Enchir. fung. (Paris): 23 (1886)
Clitocybe flaccida (Sowerby) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 124 (1871)
Clitocybe flaccida var. arenaria Hruby, Hedwigia 70: 245 (1930)
Clitocybe flaccida var. fibrillosa Malençon, in Malençon & Bertault, Trav. Inst. Sci. Chérifien, Sér. Bot. Biol. Veg. 3
Paralepista flaccida var. fibrillosa (Malençon) Vizzini, in Vizzini & Ercole, Mycotaxon 120: 262 (2012)
Paralepista inversa (Scop.) Raithehl., Die Gattung Clitocybe (Stuttgart) 1: 17 (1981)

Cappello: 4-10 cm, inizialmente convesso-ombelicato, poi nettamente imbutiforme, margine intero; superficie liscia, arancio-rosato, ocra-arancio, arancio-fulvastro, più chiara col secco.

Lamelle: nettamente decorrenti, fitte, biancastre con riflessi crema.

Carne: biancastra, elastica, con odore fungino dolciastro, sapore simile.

Gambo: 2-5 x 0,5-1 cm, cilindrico, piuttosto breve, più chiaro del pileo.

Spore: 3-5 x 3,5-4,5 um, subglobose, finemente verrucose.

Habitat: autunno, inizio inverno, in gruppi di numerosi esemplari su lettiera. Molto comune.

Autore della scheda: Flavio Franco Pinton Cds. gmc.

Autore delle foto: Dino G. Cerantola Cds. gmc.