

**SCHEDA N° 0304**

**ORDINE Agaricales**

|                                    |  |  |                 |
|------------------------------------|--|--|-----------------|
| <b>GENERE</b> <i>Parasola</i>      | <b>SPECIE</b> <i>P. conopilea</i>        | <b>AUTORE</b> (Fr.) Örstadius & E. Larss.                |                 |
| <b>DATA DI RACCOLTA</b> 22-11-2021 | <b>LUOGO DI RACC.</b> Cà Marcello Levada | <b>COMUNE</b> Piombino Dese                              | <b>PROV.</b> PD |
| <b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 25        | <b>I.G.M.</b> IV 127                     | <b>RACCOGLITORE</b> Dino G. Cerantola - Flavio F. Pinton |                 |

**HABITAT:**

|   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI                     | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI                     | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO          | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO                    | <input type="checkbox"/> ARENILE  |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA                         | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A                 |   |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME                  | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO                      | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO                                |
| <b>BOSCO DI:</b> PLANIZIALE DI LATIFOGIE DI VARIE ESSENZE |  | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO                  | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO     | <input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE                           |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO                         | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI  |

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:** piante di varie essenze di latifoglie

**NOTE:** due stazioni di crescita in numerosi esemplari in un vialetto in prossimità di una siepe, su residui legnosi marcescenti

**MICROSCOPIA:** Spore ellissoidali, appiattite 14,8-16,6 x 7,5-8,5 µm, lisce, con largo poro germinativo più o meno eccentrico

**BIBLIOGRAFIA:** Funghi d'Italia Zanichelli pag. 392 al n°1093 Funghi d'Italia A M B vol. 2 pag.806

**DETERMINATORE** Dino G. Cerantola - F. F. Pinton

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**  FRESCHI  SECCHI



**PARASOLA CONOPILEA**



**PARASOLA CONOPILEA**



**PARASOLA CONOPILEA**



**PARASOLA CONOPILEA**



**PARASOLA CONOPILEA**



**PARASOLA CONOPILEA IMENIO**

## DESCRIZIONE

### Parasola conopilea

**Ordine:** Agaricales  
**Famiglia:** Psathyrellaceae  
**Genere:** Parasola  
**Specie:** P. conopilea

Sottogenere: >>>Psathyrella Fr. - Lamelle non lacrimanti; spore lisce, generalmente > di 10 µm; basidi generalmente subcilindrici e tozzi (sezioni Psathyrella, Hammophilae, Subatratae e bipelles)

**Sinonimi:** Agaricus aratus Berk., Outl. Brit. Fung. (London): 176 (1860)  
Agaricus conopileus Fr. [as 'conopilus'], Syst. mycol. (Lundae) 1: 504 (1821)  
Agaricus conopileus f. superbus (Cooke) Cooke, Ill. Brit. Fung. (London) 8: pl. 1185 (1158) (1891)  
Agaricus conopileus var. superbus Cooke, Handb. Brit. Fungi, 2nd Edn: 378 (1891)  
Psathyrella conopilea (Fr.) A. Pearson & Dennis, Trans. Br. mycol. Soc. 31(3-4): 185 (1948) [1947]  
Psathyrella conopilea f. substerilis Enderle, Z. Mykol. 66(1): 7 (2000)

**Cappello:** 20-40 mm, conico-campanulato, alla fine solo leggermente appiattito, bruno-rossastro più o meno scuro, igrofano, con tempo secco via via giallastro o bruno-grigiastro molto chiaro, con superficie liscia, opaca, presto striato.

**Lamelle:** più o meno strettamente adnate, piuttosto fitte, un po' panciute, diritte e ascendenti, all'inizio grigio-brunastro più o meno chiaro, poi bruno-porpora con il filo bianco, minutamente fimbriato.

**Carne:** nel cappello da bruno-rossastro scuro a bruno-grigiastro, poi bianco sporco, nel gambo bruna, con un sottile strato superficiale bianco, con odore e sapore non significativi.

**Gambo:** 90-170 x 2-5 mm, cilindrico, con la base talvolta leggermente ispessita o anche bulbosa, bianco o biancastro, un po' isabellino nella parte inferiore, cavo, lucente, liscio oppure finemente striato, con l'apice pruinoso e la base irta di peli bianchi.

**Spore:** ellissoidali, appiattite 14,8-16,6 x 7,5-8,5 µm, lisce, con largo poro germinativo più o meno eccentrico, bruno-rossastre al MS; pleurocistidi assenti; cheilocistidi lageniformi, con collo più o meno lungo, cellule sferopeduncolate; pileipellis costituita da uno strato di cellule globoso-piriformi, miste a seta e piuttosto numerose, con parete spessa, brunastre, lunghe 100-400 µm, attenuate verso l'apice, Sporata nerastra.

**Habitat:** cresce normalmente gregaria, a gruppi anche molto numerosi, nelle radure erbose dei boschi, in mezzo all'erba, al bordo dei sentieri, dall'estate all'autunno; relativamente comune.

Autore della scheda: Flavio F. Pinton Cds.gmc.

Autore delle foto: Dino G. Cerantola Cds.gmc.