

COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it

Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



SCHEDA N° 0159				ORDINE Agaricales		
GENERE Phaeolepiota	SPECIE P. aurea			AUTORE (Matt.) Maire		
DATA DI RACCOLTA 18/09/2015	LUOGO DI RACC. Lago dei Caprioli COMU			UNE Pellizzano PROV. TN		
ALTITUDINE S.L.M. 1300				COGLITORE Dino Giuseppe Cerantola		
HABITAT:					**	
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI			☐ MARGINI DI STRADA		
TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO			ARENILE		
☐ TORBIERA	TERRENO COLTIVATO A					
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO			☐ BOSCO SUBALPINO		
BOSCO DI: MISTO AGHI-LATIFOGLI	LIE			☐ RADO ☐ FITTO		
DENTRO AL BOSCO	AI MARGINI I	DEL BOSCO		⊠ IN R	ADURE	
☐ SU LEGNO	□ vivo	☐ MORTO	DI	LUOGHI	APERTI TRA IL MUSC	HIO, LE ORTICHE.
ESPOSIZIONE:				☐ MEDIA		
UMIDITA' DEL TERRENO	☐ ACOUITRINO	SO MOLTO UMIDO	) × 1	MIDO	☐ ASCIUTTO	☐ SECCO
VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Misto latifoglie e aghifoglie, Abete rosso-bianco						
Note: stazione di crescita di numerosi esemplari, spesso subcespitosi, in luoghi aperti tra il muschio, le ortiche.						
MICROSCOPIA: spore 10-12 x 4,5-5,5 μm, ellissoidali, fusiformi, ocra rosate ma rugginose in massa, non amiloidi.						
BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia A.M.B Vol. 1 - pag. 228 - Funghi d'Italia Zanichelli pag. 189 al 494						
DETERMINATORE Dino Giuseppe Cerantola  RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI   □ SECCHI						
PHAEOLEPIOTA AUREA	P		ino G. Cerantolo			O DIEGO GOGARDIA.
PHAEOLEPIOTA AUREA						



## COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV

E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



## DESCRIZIONE

Phaeolepiota aurea

Ordine: Agaricales
Famiglia: Tricholomataceae
Genere: Phaeolepiota
Specie: P. aurea

Sezione:

Cappello: 5-15 cm, dapprima subgloboso, poi piano-convesso, carnoso, con una forma leggermente depressa o umbonata. Margine arrotondato e decorato da resti del velo. Superficie interamente ricoperta da abbondante e grossolana granulazione, giallo-ocraceodorato.

Lamelle: Annesse, fitte e serrate, sublibere, arrotondate verso il gambo, inizialmente ocra- biancastro poi color ruggine, poi quasi color cannella.

Carne: Soda, biancastra-giallina, con sfumature rossastre a livello del pileo, rossastra, forte odore aromatico e deciso, odore gradevole di mandorle.

**Gambo:** 12-20 x 1-2,5 cm, cilindraceo, robusto, pieno e sodo un pò ingrossato alla base e leggermente svasato verso l'alto. Anello ampio, ascendente, permanente, formato dall'allungamento del velo che inguaina gran parte del gambo e che è facilmente distaccabile sino al base.

**Spore:** 10-12 x 4,5-5,5 μm, ellissoidali, fusiformi o lungamente ellissoidali, ocra rosate ma rugginose in massa, non amiloidi.

**Habitat:** Specie rara e poco diffusa ma fedele a luoghi di crescita che fruttifica abbondante, spesso subcespitosa, spesso su terreno smossi; al bordo di sentieri e boschi in luoghi aperti. in estate-autunno.

Autore della scheda: Dino Giuseppe Cerantola

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola