

SCHEDA N° 0114

ORDINE Boletales

GENERE <i>Phylloporus</i>	SPECIE <i>P. pelletieri</i>	AUTORE (Lév.) Quél.
DATA DI RACCOLTA 27/06/014	LUOGO DI RACC. Possagno	COMUNE Possagno
ALTITUDINE S.L.M. mt.300	I.G.M. II 083	RACCOLITORE Pinton Franco Flavio

HABITAT:

☐ PRATERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☒ MARGINI DI STRADA
☒ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	BOSCO
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☒ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI : LATIFOGIE MISTE CASTAGNO-BETULLA-CARPINO		☒ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☒ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	SU TERRA E MUSCHIO

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☒ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Castagno, Carpino e cespugli di rovo

NOTE : al margine di un sentiero molto ombroso e umido, su terreno arenoso, acido, sopra il muschio

MICROSCOPIA: spore ellissoidali fusiformi lisce di colore giallo pallido 10,5-13,5x3,8-5µ

BIBLIOGRAFIA : Funghi D'Italia C. Papetti e G. Consiglio vol. 1 pag.368 Funghi D'Italia Zanichelli pag. 500 al n° 1400

DETERMINATORE c.d.s. G.M.C

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI



PHYLLOPORUS PELLETERI




PHYLLOPORUS PELLETERI




PHYLLOPORUS PELLETERI



PHYLLOPORUS PELLETERI



BASIDIOLI



SPORE

DESCRIZIONE

Phylloporus pelletieri

Ordine: Boletales
Famiglia: Boletaceae
Genere: Phylloporus
Specie: pelletieri

Cappello: 3-10 cm; da subemisferico a convesso, infine appianato-depresso con orlo $\pm$ ondulato; superficie vellutata, opaca, glabrescente, di colore bruno-rossastro, bruno-porpora, inizialmente unita, poi screpolata.

Lamelle: da adnate a $\pm$ decorrenti e rade, con filo irregolare, tipicamente venose- congiunte, giallo-oro $\pm$ intenso.

Carne: ocrata-rosata pallido nel pileo, giallastra verso la base, odore e sapore sgradevole.

Gambo: 3-7 x 0,5-2 cm; cilindrico, talvolta un po' eccentrico, ricurvo con base attenuata, di colore giallo e liscio in alto, fioccoso-fibrilloso nel tratto inferiore, percorso da striature o costolature bruno-rossicce.

Spore: elssoidali-fusiformi, lisce, di colore giallo pallido 11-14 x 4,5-6 μ epicute costituito da un tricotoderma disordinato di elementi cilindrici intrecciati. Sporata ocrata brunastro.

Habitat: estate-autunno; sotto aghifoglie e latifoglie. Raro, diffuso in talune annate favorevoli.

Autore della scheda: c.d.s. Gruppo Micologico Castellano.

Autore delle foto: Pinton Franco Flavio