

**SCHEDA N° 0212**

**ORDINE Agaricales**

<b>GENERE</b> <i>Pleurotus</i>	<b>SPECIE</b> <i>P. dryinus</i>	<b>AUTORE</b> (Pers.) P. Kumm.	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 26/09/2017	<b>LUOGO DI RACC.</b> Vallà	<b>COMUNE</b> Riese Pio X	<b>PROV.</b> TV
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 54	<b>I.G.M.</b> I 104	<b>RACCOGLITORE</b> Franco Flavio Pinton	

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input checked="" type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<b>BOSCO DI:</b>		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input checked="" type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input checked="" type="checkbox"/> MORTO	DI <b>LATIFOGLIA MISTA</b>

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:** cumulo di tronchetti tagliati, in prossimità di siepe sempreverde

**NOTE:** in un cumulo su fasciame di tronchetti di latifoglie, in periodo molto siccitoso; ma dopo un'abbondante pioggia

**MICROSCOPIA:** Spore 9-15 x 3,5-5 µm cilindriche, lisce, con una o più guttule, basidi tetra e bisporici

**BIBLIOGRAFIA:** Funghi d'Italia Zanichelli pag. 194 al 496 - Funghi d'Italia A.M.B vol 3 a pag 1005.

**DETERMINATORE** Franco Flavio Pinton

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**  FRESCHI  SECCHI



**PLEUROTUS DRYINUS**



**PLEUROTUS DRYINUS**



**PLEUROTUS DRYINUS**



**PLEUROTUS DRYINUS**



**PLEUROTUS DRYINUS**

## DESCRIZIONE

Pleurotus dryinus

**Ordine:** Agaricales  
**Famiglia:** Pleurotaceae  
**Genere:** Pleurotus  
**Specie:** P. dryinus  
**Sezione:**

**Sinonimi:** Agaricus dryinus. ( Pers. ) Comm. Schaeff. Icon. Pict. 96 ( 1800 )  
Lentodiopsis dryina .( Pers. ) Kriese. Handbuch. für. Pilzfreund. Edn.

**Capello:** 5 - 15 cm. di diametro, prima convesso, poi quasi appianato, biancastro, margine lobato, sottile inizialmente involuto ed appendicolato per resti di velo generale biancastro. Cuticola feltrata ricoperta da piccole squame grigio-biancastre.

**Lamelle:** spaziate, decorrenti, anastomizzate, da bianche a crema, poi giallo-pallide in maturità.

**Carne:** fibrosa e tenace, biancastra, gialla se invecchiata. Odore piacevole e sapore fungino.

**Gambo:** 2- 6 x 1- 4 cm. eccentrico o laterale, tozzo, talora ricurvo, biancastro, feltroso, ornato da resti di velo generale.

**Spore:** 9-15 x 3,5-5 µm cilindriche, lisce, con una o più guttule, basidi tetra e bisporici.

**Habitat:** dalla fine estate, autunno su diversi tronchi in decomposizione, anche viventi di latifolia, isolato o in forma di piccoli gruppi sovrapposti, ( querce, noci, salici, aceri, specialmente faggio ). poco comune.

Autore della scheda: Cerantola bruno

Autore delle foto: Franco Flavio Pinton