

SCHEDA N° 0324

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Pluteus</i>	SPECIE <i>P.aurantiorugosus</i>	AUTORE (Trog) Sacc.,	
DATA DI RACCOLTA 23/10/2021	LUOGO DI RACC. Parco Sile	COMUNE Casacorba	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 31	I.G.M. III 105	RACCOGLITORE Claudio Gazzola	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input checked="" type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: PLANIZIALE DI LATIFOGLIE VARIE		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input checked="" type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input checked="" type="checkbox"/> MORTO	DI <input type="checkbox"/> CEPPAIA DEGRADATA DI LATIFOGLIA

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: piante varie di latifoglie in prossimità di un coso d'acqua

NOTE: Stazione di crescita gregaria, di più carpofori in una ceppaia molto degradata e marcescente di latifoglia

MICROSCOPIA: Spore: subglobose; largamente ellissoidali 6-7,5 x 4,5-5 um. grigiastre-rosate al Ms sporata rosa cannella

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag.54 al n.86 Funghi d'Italia AMB vol.2 pag. 668

DETERMINATORE Cds Gmc

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



PLUTEUS AURANTIORUGOSUS



PLUTEUS AURANTIORUGOSUS



PLUTEUS AURANTIORUGOSUS



P. AURANTIORUGOSUS IMENIO



P. AURANTIORUGOSUS IMENIO



P. AURANTIORUGOSUS SEZIONE

DESCRIZIONE

Pluteus aurantiorugosus

Ordine: Agaricales
Famiglia: Agaricaceae
Genere: *Pluteus*
Specie: *P. aurantiorugosus*

Sezione: Sezione >>Celluloderma Fayod - Pleurocistidi non uncinati all'apice, pileipellis almeno in parte costituita da elementi sferopeduncolati; u. af. assenti.

Sinonimi: *Agaricus aurantiorugosus* Trog, Mitt. naturf. Ges. Bern 385-407: 32 (1857)
Hyporrhodius aurantiorugosus (Trog) Migula, Krypt.-Fl. Deutschl. Österr. Schweiz
Pluteus aurantiorugosus var. *aurantiovelatus* Vizzini, in Vizzini & Ercole,
Pluteus caloceps G.F. Atk., Annls mycol. 7(4): 373 (1909)
Pluteus coccineus (Massee) J.E. Lange, Fl. Agaric. Danic. 2: 88 (1937)

Capello: 3-6 cm; da emisferico-campanulato a convesso, ± striato al margine; rosso-arancio superficie liscia o appena rugosa al centro; pruinosa.

Lamelle: libere, moderatamente fitte, un pò panciute, inizialmente bianche poi rosa, con il filo bianco. fioccoso.

Carne: biancastra, giallognola nel gambo; senza odore particolare, leggermente amarognola.

Gambo: 3-5 x 0,5-1 cm; cilindrico o appena più spesso in basso; bianco, a tonalità gialle-arancio verso la base; liscio.

Spore: subglobose; largamente ellissoidali 6-7,5 x 4,5-5 um. grigiastre-rosate al Ms sporata rosa cannella.

Habitat: specie estivo-autunnale; cresce su ceppi e resti legnosi di latifoglie. Raro.

Autore della scheda: Flavio F. Pinton Cds Gmc

Autore delle foto: Claudio Gazzola