

SCHEDA N° 0105

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Pluteus</i>	SPECIE <i>P. cervinus</i>	AUTORE (Schaeff.) P. Kumm.
DATA DI RACCOLTA 01/11/20011	LUOGO DI RACC. parco cittadino	COMUNE Castelfranco veneto
ALTITUDINE S.L.M. 44	I.G.M. II 104	PROV. tv
RACCOGLITORE Franco Flavio Pinton		

HABITAT:

☐ PRATERBOSI	☒ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	☐ BOSCO SUBALPINO
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ RADO
☐ BOSCO DI : MISTO DI AGHI-LATIFOGIE		☒ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☒ SU LEGNO	☐ VIVO	☒ MORTO
		☐ DI
		☐ CEPPAIA DI CARPINUS

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☒ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☒ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Carpini-aceri-betulle

NOTE : tre esemplari crescenti in ceppaia di carpinus molto degradata

MICROSCOPIA: spore in massa rosa salmone pallido subglobose 6-8 x 4,5-6 µm. pleurocistidi con parete spessa uncinati all'apice

BIBLIOGRAFIA : Zanichelli Funghi d'Italia pag.50 al n°76 funghi d'Italia A.M.B vol I° pag.138

DETERMINATORE C.D.S

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI




PLUTEUS CERVINUS




PLUTEUS CERVINUS CAPPELLO




PLUTEUS CERVINUS IMENIO



PLEUROCISTIDI



PLEUROCISTIDI CON SPORE



SPORE

DESCRIZIONE

Genere e specie
Pluteus cervinus

Ordine: Agaricales
Famiglia: Plutaceae
Genere: *Pluteus*
Specie: *cervinus*
Sezione: *Pluteus* (= *Trichodermi* Fayod)

Cappello: da 4 a 15 cm. convesso poi cono, ampio con largo umbone; margine acuto disteso, inizialmente regolare, poi lobato o ondulato superficie liscia mai vischiosa sericea lucida, fibrillosa soprattutto verso il centro del cappello. di colore bruno ocraceo, bistro, bruno molto scuro quasi nero, o anche bruno ocraceo, caffelatte, con margine nettamente più chiaro.

Lamelle: libere al gambo, piuttosto fitte, con molte lamellule, larghe ventricose, con tagliente irregolare; di colore da bianco a grigio rosato, infine rosa incarnato, con taglio biancastro.

Carne: elastica ma fragile nel cappello presto fibrosa nel gambo; di colore biancastro, ma bruniccio sottola la cuticola pileica ed alla base del gambo. odore debole rafanoide o come di patata, sapore dolce un pò amarognolo.

Gambo: da 5 cm a 15 x 0,8 a 2,5 cm. cilindrico dritto, attenuato verso l'alto e con base allargata o bulbosa, fino a 3,3 cm di diametro; superficie sericea, longitudinalmente striata da fini fibrille grigio-brunastre su fondo bianco. apice spesso inizialmente con pruina biancastra.

Spore: in massa rosa salmone pallido subglobose 6-8 x 4,5-6 µm. pleurocistidi con parete spessa uncinati all'apice.

Habitat: su legno morto generalmente di latifolia, più raramente di aghifolia, dalla primavera al tardo autunno; isolato o a gruppi di pochi esemplari.

Autore della scheda: G.M.C

Autore delle foto: Franco Flavio Pinton