

SCHEDA N° 0256

ORDINE Boletales

GENERE <i>Porphyrellus</i>	SPECIE <i>P. porphyrosporus</i>	AUTORE (Fr. & Hök) E.-J. Gilbert	
DATA DI RACCOLTA 23-08-2015	LUOGO DI RACC. Gosaldo	COMUNE Gosaldo	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1200	I.G.M. II 045	RACCOGLITORE Franco Flavio Pinton	

HABITAT:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: MISTO AGHI-LATIFOGLE | | <input type="checkbox"/> RADO <input checked="" type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Picea abies- Fagus

NOTE: stazione di crescita di pochi esemplari gregari, nell'erba sotto Abete rosso

MICROSCOPIA: spore fusiformi 12,5-17,0 x 6,5-8,5 µm lisce, brunastro pallido, sporata bruno-rossastro

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag.476 al n°1343 Funghi d'Italia A.M.B. vol. 2 pag.905

DETERMINATORE FrancoFlavio Pinton
c.d.s. G.M.C

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



PORPHYRELLUS PORPHYROSPORUS 23-08-2015



PORPHYRELLUS PORPHYROSPORUS 23-08-2015



PORPHYRELLUS PORPHYROSPORUS 23-08-2015



PORPHYRELLUS PORPHYROSPORUS 31-08-2018



PORPHYRELLUS PORPHYROSPORUS



PORPHYRELLUS PORPHYROSPORUS

DESCRIZIONE

Porphyrellus porphyrosporus

Ordine: Boletales

Famiglia: Boletaceae

Genere: **Porphyrellus**

Specie: porphyrosporus

Sezione: E.J. Gilbert -Basidiomi interamente brunastro, pileo finemente vellutato, carne bianca virante debolmente al rosa

Sinonimi: *Boletus porphyrosporus* var. *minor* Bataille & Crawshay, Bull. Soc. mycol. Fr. 39(4): 267 (1924) [1923]
Gyroporus porphyrosporus (Fr. & Hök) Quéf.

Cappello: 5-10 cm; da emisferico a convesso; superficie opaca, asciutta, finemente tomentosa, di colore bruno scuro, marrone-olivastro uniforme.

Tubuli: alti, liberi, crema giallastro, poi bruno-porpora; pori più o meno angolosi, irregolari, biancastri, poi grigio-brunastro-scuro blu-nerastro al tocco.

Carne: biancastra, debolmente grigio-azzurrognola alla sezione, in seguito annerente; odore e sapore poco gradevoli.

Gambo: 6-12 x 1-2,5 cm; subcilindrico, senza reticolo, concolore al cappello, pruinoso-vellutato.

Spore: fusiformi 12,5-17,0 x 6,5-8,5 µm lisce, brunastro pallido, sporata bruno-rossastro

Habitat: in estate-autunno; sotto aghifoglie, boschi misti, soprattutto in montagna. Piuttosto raro.

Autore della scheda: Franco Flavio Pinton x c.d.s.G.M.C.

Autore delle foto: Franco Flavio Pinton