

COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



SCHEDA N° 0258		ORDINE Agaricales	
GENERE Pseudosperma	SPECIE P. rimosum	AUTORE (Bull.) Matheny & Esteve-Rav.	
DATA DI RACCOLTA 11/10/2020	Luogo di racc. Vallà	COMUNE Riese Pio X° PROV. TV	
ALTITUDINE S.L.M. 54	I.G.M. I 104	RACCOGLITORE Dino Giuseppe Cerantola	
HABITAT:			
PRATI ERBOSI	ORTI E GIARDINI	MARGINI DI STRADA	
TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE	
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A		
ARGINE DI FIUME	LUOGO BRUCIATO	BOSCO SUBALPINO	
BOSCO DI:		☐ RADO ☐ FITTO	
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE	
SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI	
ESPOSIZIONE:	☐ ASSOLATA ☐ OI	MBROSA MEDIA	
UMIDITA' DEL TERRENO	☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UM	MIDO 🗵 UMIDO 🗌 ASCIUTTO 🔲 SECCO	
VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: al n	nargine di un fossato, in prossimità di	i varie essenze arboree	
NOTE: stazione di crescita gregar	ia		
MICROSCOPIA: 9,5-15 x 5-8 μm, fa	seoliformi-ellissoidali		
BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia (Bo	ccardo, Traverso, Vizzini, Zotti) pag.	.362, Fumghi d'Italia A.M.B. vol.1 pag 165	
DETERMINATORE C.d.S. G.M.C.	RILIEVI EFF	FETTUATI SU REPERTI 🔲 FRESCHI 🔲 SECCHI	
PSEUDOSPERMA RIMOSUM PSEUDOSPERMA RIMOSUM PSEUDOSPERMA RIMOSUM	PSEUDOSPERMA RIM PSEUDOSPERMA RIM	d-Bino G. Gerantola	antoja t



COMITATO DI STUDIO "Fernando Fraccaro" Via Verdi n°3 Castelfranco Veneto TV

E-mail: segreteria@gruppomicologicocastellano.it Sito internet: www.gruppomicologicocastellano.it



DESCRIZIONE

Pseudosperma rimosum

Ordine: Agaricales
Famiglia: Inocybaceae
Genere: Pseudosperma
P. rimosum

Sezione: Finchè la specie è appartenuta al genere Inocybe, la sezione corrispondente era quella delle Rimosae

Sinonimi: Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm.

Inocybe fastigiata (Schaeff.) Quél. Gymnopus rimosus (Bull.) Gray

Cappello: diametro compreso fra 3 e 7 cm, dapprima conico-campanulato per poi distendersi, con presenza di umbone più o meno acuto di colore piùscuro; la superficie si presenta con fibrille sericee e, man mano che si procede verso il margine, appare sempre più lacero-fessurata, con colorazioni comprese tra il giallo paglierino e l'ocra carico, con sfumature fulve

Lamelle: biancastre in gioventù con vaghi riflessi verdognoli, sfumano poi a maturità verso tinte bruno-olivastre, con il filo che resta comunque più chiaro; arcuate smarginate e uncinate

Carne: biancastra con odore terroso-spermatico

Gambo: lunghezza compresa tra i 5 e i 10 cm, diametro mediamente inferiore a 1 cm ma ingrossato alla base; biancastro con tendenza a sfumare verso tinte ocra a maturità o dopo manipolazione; sericeo e finemente fibrilloso, con una vaga presenza di pruina e fioccosità nella parte superiore

Spore: lisce a forma di fagiolo o ellissoidale, 9,5-15 x 5-8,3 μm; i basidi si presentano claviformi e tetrasporici; pleurocistidi assenti; cheilocistidi cilindracei, clavati o utriformi

Habitat: tra l'estate e l'autunno inoltrato, sia nei prati erbosi che ai bordi di sentieri o anche in zone boschive dove si trova a suo agio sia sotto aghifoglie che latifoglie

Autore della scheda: C.d.S. G.M.C

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola