

**SCHEDA N° 0300**

**ORDINE Agaricales**

<b>GENERE</b> <b>Rhodocollybia</b>	<b>SPECIE</b> <i>R. butyracea</i> f. <i>asema</i>	<b>AUTORE</b> (Fr.) Antonín, Halling & Noordel	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 08-11-2 021	<b>LUOGO DI RACC.</b> Cà Marcello Levada	<b>COMUNE</b> Piombino Dese	<b>PROV.</b> PD
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 25	<b>I.G.M.</b> IV 127	<b>RACCOGLITORE</b> Dino Cerantola - Flavio Pinton	

**HABITAT:**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI            | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI     | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO    | <input type="checkbox"/> ARENILE           |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA                | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A |  |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME         | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO      | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO   |

**BOSCO DI:** PLANIZIALE LATIFOGIE MISTE PREVALENZA CARPINUS

RADO  FITTO

- |  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO     | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO        | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI                                 |

**ESPOSIZIONE:**  ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**  ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:** Filari di Carpini bianchi di notevoli dimensioni

**NOTE:** Stazione di crescita di pochi esemplari sotto abbondante strato di foglie di Carpini

**MICROSCOPIA:** Spore: ellissoidali-larmiformi; 6-8 x 3-4 um.

**BIBLIOGRAFIA:** Funghi d'Italia Zanichelli pag. 206 al n°529 - Funghi d'Italia AMB vol.1 al n° 94

**DETERMINATORE** Franco Flavio Pinton

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**  FRESCHI  SECCHI



**RHODOCOLLYBIA BUTYRACEA F. ASEMA**



**RHODOCOLLYBIA BUTYRACEA F. ASEMA**



**RHODOCOLLYBIA BUTYRACEA F. ASEMA**



**RHODOCOLLYBIA BUTYRACEA F. ASEMA**



**RHODOCOLLYBIA BUTYRACEA F. ASEMA**

## DESCRIZIONE

### **Rhodocollybia butyracea f. asema**

**Ordine:** Agaricales  
**Famiglia:** Agaricaceae  
**Genere:** Rhodocollybia  
**Specie:** **R. butyracea f. asema**  
**Sezione:**

**Sinonimi:** Agaricus asemus (Fr.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 121 (1821)  
Agaricus bibulosus Masee, Grevillea 20(no. 95): 95 (1892)  
Agaricus butyraceus Bull., Herb. Fr. (Paris) 12: tab. 572 (1792)  
Agaricus butyraceus var. aureus Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 84 (1838) [1836-1838]  
Agaricus butyraceus var. communis Fr., Observ. mycol. (Havniae) 2: 123 (1818)

**Cappello:** 4-8 cm; da convesso a spianato con umbone ± accentuato; superficie glabra, di aspetto lardaceo, grasso, vischiosa a tempo piovoso, igrofana, di colore variabile, sul beige-grigiastro più pallido al margine e con il secco.

**Lamelle:** poco fitte, ± libere, crema-biancastre.

**Carne:** crema-biancastra, acquosa, senza odore e sapore particolari.

**Gambo:** 4-8 x 1-2 cm; da cilindrico a sub-claviforme, liscio o striato longitudinalmente soprattutto verso il basso, con colore al pileo, base sempre ± ricoperta da feltrosità biancastra.

**Spore:** 6-8 x 3-4 um.

**Habitat:** estate-autunno; sotto aghifoglie e latifoglie. NOTE - Presenta caratteristiche simili a quelle di *Collybia butyracea* differendo da questa solo per il colore del cappello che a maturità passa a un grigio verdastro chiaro o grigio alutaceo, con il centro più scuro, per la minore carnosità e per l'aspetto generalmente un po' più slanciato.

Autore della scheda: Franco Flavio Pinton Cds. gmc

Autore delle foto: Franco Flavio Pinton