

SCHEDA N° 0336

EXSICCATA N° FCRV-181

ORDINE Boletales

GENERE Rubroboletus	SPECIE R. dupainii		AUTORE (Boud.) Kuan Zhao & Zhu L. Yang	
DATA DI RACCOLTA 27/07/2025	LUOGO DI RACC. San Rocco colli Possagno	COMUNE Possagno		PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 521	I.G.M. II 083		RACCOLTITORE Dino G. Cerantola - Flavio F. Pinton	
RIFERIMENTO CARTOGRAFICO 45.861266, 11.869492				

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: <i>OSTRYA CARPINIFOLIA</i> E <i>CASTANEA SATIVA</i> | | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☒ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Latifoglie miste con prevalenza *Castanea sativa* e *Ostrya carpinifolia*.

NOTE: Due stazioni di crescita ravvicinate su terreno calcareo molto secco

MICROSCOPIA: 10-14 x 4-6 µm; subfusiformi, lisce, con grossa guttula centrale, con parete spessa. Sporata bruno oliva.

BIBLIOGRAFIA: AMB Vol. 1 - pag. 268 - Zanichelli pag. 490 al 1379 - 1260 Funghi Provincia Belluno pag 508

DETERMINATORE Dino G. Cerantola - Flavio F. Pinton

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI



RUBROBOLETUS DUPAINII IN HABITAT



RUBROBOLETUS DUPAINII



RUBROBOLETUS DUPAINII



RUBROBOLETUS DUPAINII



RUBROBOLETUS DUPAINII



MICRO SPORE

DESCRIZIONE

Rubroboletus dupainii

Ordine: Boletales
Famiglia: Boletaceae
Genere: Rubroboletus dupainii
Specie: R. dupainii
Sezione:

Sinonimi: Boletus dupainii Boud. 1902
Tubiporus dupainii (Boud.) Maire 1937
Suillellus dupainii (Boud.) Blanco-Dios 2015

Cappello: rosso vivo brillante, fino a 12 cm di diametro, emisferico, carnoso con orlo prima rivolto in basso, poi disteso, debordante oltre i tuboli. Cuticola liscia, lucente-laccata, untuosa a tempo umido quindi asciutta, rosso scarlatto vivace, tende a sbiadire sull'ocra-giallastro con l'età.

Imenoforo: Tubuli lunghi e sinuati al gambo di colore giallo poi verdastri, bluastrì al taglio e alla manipolazione.
Pori piccoli, tondi, rosso- arancio, blu alla pressione.

Carne: bianco-giallastra, sfumata di rosso sotto la cuticola, è molle nel cappello e più soda nel gambo, bluastrò ± intenso al taglio.
Odore debole fruttato e sapore acidulo.

Gambo: 5-10 x 3-5 cm; di forma variabile, attenuato in basso, cilindrico, bulboso, clavato, di colore giallo pallido, vira debolmente al bluastrò se manipolato; ricoperto da fine granulazioni rosse su fondo giallo, a volte è presente un reticolo solo all'apice in prossimità dei tubuli.

Spore: 10-14 x 4-6 µm; subfusiformi, lisce, con grossa guttula centrale, con parete spessa. Sporata bruno oliva.

Habitat: Cresce gregario a piccoli gruppi nei boschi termofili di Quercia, Castagno. Ritrovato su terreno calcareo con latifoglie miste con prevalenza Castanea sativa e Ostrya carpinifolia.

Autore della scheda: Cds GMC

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola