

**SCHEDA N° 0323**

**ORDINE Agaricales**

<b>GENERE</b> Russula	<b>SPECIE</b> R. carpini	<b>AUTORE</b> R. Girard et Heinem	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 05/09/2022	<b>LUOGO DI RACC.</b> Cà Marcello Levada	<b>COMUNE</b> Piombino Dese	<b>PROV.</b> PD
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 25	<b>I.G.M.</b> IV 127	<b>RACCOGLITORE</b> Dino G. Cerantola - Flavio F. Pinton	

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<b>BOSCO DI:</b> PLANIZIALE LATIFOGIE VARIE		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:** filari di Carpini e altre latifoglie

**NOTE:** Stazione di crescita gregaria, in diversi esemplari sotto Carpinus ambiente asciutto

**MICROSCOPIA:** spore ovoidali-ellittiche, 7,5-10 x 7-8 um, echinulate. parzialmente amiloidi Sporata: giallo scuro

**BIBLIOGRAFIA:** Funghi d'Italia Zanichelli pag.458 al n°1287 Funghi d'Italia AMB vol. 3 pag.1341

**DETERMINATORE** Dino Cerantola - Flavio Pinton

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**  FRESCHI  SECCHI



**RUSSULA CARPINI**



**RUSSULA CARPINI**



**RUSSULA CARPINI**



**RUSSULA CARPINI**



**RUSSULA CARPINI**

## DESCRIZIONE

### **Russula carpini**

**Ordine:** Agaricales

**Famiglia:** Agaricaceae

**Genere:** Russula

**Specie:** R.carpini

**Sezione:** Sottosezione >>Integriforminoe Bon - Sporata generalmente gialla, eccezionalmente crema, ocrea; carne a volte ingiallente (R. carpini) o annerente, dermatocistidi non incrostati, generalmente non settati (eccezione, R. corpim).

**Sinonimi:** Russula carpini f. olens Donelli, XXV Mostra reggiana del Fungo 1-3: 32 (2000)  
Russula carpini f. tenella Bon, Fungorum Rariorum Icones Coloratae 11: 16 (1979)  
Russula carpini var. tenella (Bon) Bon, Docums Mycol. 18(nos 70-71): 65 (1988)

**Capello:** da 4-10 cm; caratteristicamente campanulato in gioventù, poi appena depresso in vecchiaia; margine nettamente scanalato negli esemplari maturi; superficie liscia, ± brillante, di colore assai variabile: rosso-vinoso, violetto, con brusche decolorazioni verdastre, ingiallente.

**Lamelle:** giallo-arancio a maturità, molto fragili, macchiate di ruggine.

**Carne:** bianca, presto ingiallente, abbastanza soda; odore trascurabile; sapore mite, appena piccante nelle lamelle dei giovani esemplari.

**Gambo:** 3-7 x 1-2,5 cm; cilindrico, talora claviforme nettamente bruno-ruggine a partire dalla base.

**Spore:** ovoidali-ellittiche, 7,5-10 x 7-8 um, echinulate, parzialmente amiloidi Sporata: giallo scuro.

**Habitat:** dalla primavera estate; boschi di *Ostrya carpinifolia*. Sporadica.

Autore della scheda: Flavio F. Pinton per C.d.s. Gmc

Autore delle foto: Dino G. Cerantola