

SCHEDA N° 0325

ORDINE Russulales

GENERE Russula	SPECIE R. Parazurea	AUTORE Jul. Schäff. 1931	
DATA DI RACCOLTA 05 - 09- 2022	LUOGO DI RACC. Cà Marcello Levada	COMUNE Piombino Dese	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 25	I.G.M. IV 127	RACCOGLITORE Dino G. Cerantola - Flavio F. Pinton	

HABITAT:

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: LATIFOLGIA E AGHIFOLGIA PLANIZIALE | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Misto di latifoglie e altri arbusti e Carpini

NOTE: Stazione di crescita gregaria, e di singoli esemplari, su tratti aperti ruderali in prossimità di Carpini

MICROSCOPIA: Spore 6-8,5 x 5-6,4 µm, ellittico-ovoidali, da verrucolose a nettamente verrucose, crestato-connesse, subreticolate.

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag.436 al 1216- Funghi d'Italia AMB pag.308-Funghi in Italia Nicolò Oppicelli pag.190

DETERMINATORE GMC Castellano C.d.s.

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



RUSSULA PARAZUREA



RUSSULA PARAZUREA



RUSSULA PARAZUREA



RUSSULA PARAZUREA

DESCRIZIONE

Russula Parazurea

Ordine: Russulales
Famiglia: Russulaceae
Genere: Russula
Specie: R. Parazurea

Sezione: Sottosezione>> Griseinae J. Schaeff. - Sporata da crema a giallina, sapore della carne dolce, appena piccante nelle lamelle dei giovani esemplari, lamelle fragili, reazione variabile al solfato di ferro; dermatocistidi generalmente voluminosi annerenti con reattivi sulfoaldeidici.

Sinonimi: Russula ochrospora (Nicolaj ex Quadr. & W. Rossi) Quadr. , Documenti Mycol. 14 (n. 56): 32 (1985) [1984]
Russula palumbina subsp. parazurea (Jul. Schäff.) Konrad & Maubl. , Icones Selectae Fungorum Fasc. 9 : 418 (1935).

Cappello: 5-15 cm di diametro, carnoso e sodo, da globoso e convesso quindi espanso, depresso-ombelicato infine incavato, cuticola che si separa facilmente fino alla metà del raggio, rugosa, opaca, densamente pruinoso, di colore grigio-verde, verde cobalto uniforme, con riflessi olivastri o verde-nerastri, più scura al centro e più chiara all'orlo.

Lamelle: non molto fitte, con qualche lamellula, qua e là biforcate bianche poi color crema o giallastre.

Carne: soda, cassante, bianca, di sapore piccantino sulle lamelle dei giovani carpofori, odore debole.

Gambo: 3 -7 x 0,7-2 cm, cilindrico, bianco, macchiato di bruno in vecchiaia, assai compatto, poi farcito di un midollo spugnoso, può presentare sfumature grigio-olivastro sul fianco.

Spore: 6-8,5 x 5-6,4 µm, ellittico-ovoidali, da verrucolose a nettamente verrucose, cretato-connesse, subreticolate, sporata colore crema fino a giallo.

Habitat: Estate - Autunno, comune in parchi e giardini, sia di latifoglie che di conifere, dalla pianura alla montagna.

Autore della scheda: Bruno Cerantola.

Autore delle foto: Dino G. Cerantola.