

**SCHEDA N° 0062**

**ORDINE Russulales**

<b>GENERE</b> Russula	<b>SPECIE</b> R. vesca	<b>AUTORE</b> Fr.	
<b>DATA DI RACCOLTA</b>	<b>LUOGO DI RACC.</b> Colli di Possagno	<b>COMUNE</b> Possagno	<b>PROV.</b> TV
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 400	<b>I.G.M.</b> II 083	<b>RACCOGLITORE</b> Dino Giuseppe Cerantola	

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<b>BOSCO DI:</b> CASTAGNO		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:** Castagno, betulla, carpino.

**NOTE:** Ha qualche affinità con la russula cyanoxantha ma che ha le lamelle lardose.

**MICROSCOPIA:** Spore: ovoidali  $6,4 \div 8 \times 5,3 \div 5,8 \mu\text{m}$ , verrucose, bianche in massa.

**BIBLIOGRAFIA:** AMB Vol. 1 - pag. 303 - Zanichelli pag. 434 al 1210 - Ceto vol. 1 al 212

**DETERMINATORE** Dino Giuseppe Cerantola

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**  FRESCHI  SECCHI



**RUSSULA VESCA**



**RUSSULA VESCA\_1**



**RUSSULA VESCA\_2**



**RUSSULA VESCA\_3**



**RUSSULA VESCA\_4**



**SPORATA BIANCA**

## DESCRIZIONE

Russula vesca

Ordine: Russulales  
Famiglia: Russulaceae  
Genere: Russula  
Specie: R. vesca  
Sezione: Heterophyllae

**CAPPELLO:** con diametro di 4,5-10,0 cm, carnoso e sodo, quindi irregolarmente appianato, alla fine depresso, con orlo assottigliato; cuticola talvolta un po' ritratta verso l'orlo, presto asciutta e opaca, rosa lilacino, bruno vinoso, talora con zone indefinite pallide, crema carnicino, occasionalmente sfumata di verde-grigio, a volte tutto bianco da giovane, cuticola separabile per metà.

**Lamelle:** vagamente decorrenti e biforcute all'inserzione con il gambo, ma anche in ordine sparso, relativamente fitte, intervenate, un poco lardacee nei giovani esemplari, biancastre, macchiate di ruggine e infine di giallo alla prolungata manipolazione.

**Gambo:** Subcilindraceo, attenuato verso la base, un poco rugoloso, di colore biancastro, a volte toccato di rosa, con macchie giallo-brunastro, pieno poi spongioso, sodo, bianco tendente a macchiarsi di bruno o a ingiallire.

**Carne:** soda e compatta nei giovani esemplari, bianca, nettamente ingiallente alla corruzione e macchiata in parte di bruno; sapore interamente dolciastro ricordante la nocciola ed odore leggero, fruttato.

**Spore:** ovoidali  $6,4\div 8 \times 5,3\div 5,8 \mu\text{m}$ , verrucose, bianche in massa.

**Habitat:** simbionte, fruttifica nei boschi di latifolia e aghifolia, da fine inizio estate ad inizio autunno.

**Autore della scheda:** Dino Giuseppe Cerantola

**Autore delle foto:** Dino Giuseppe Cerantola