

SCHEDA N° 070

ORDINE Boletales

GENERE Strobilomyces	SPECIE S. strobilaceus	AUTORE (Scop.) Berk	
DATA DI RACCOLTA 10-08-12	LUOGO DI RACC. Forcella Aurine	COMUNE Gosaldo	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1300	I.G.M. II 045	RACCOGLITORE Cerantola Bruno	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
BOSCO DI : AGHIFOGLIA		<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> SU LEGNO
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Abete rosso

NOTE :

MICROSCOPIA:

BIBLIOGRAFIA : AMB Vol. 2 - pag. 906 - Zanichelli pag. 476 al 1339

DETERMINATORE Cerantola Bruno

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



STROBILOMYCES STROBILACEUS 1



STROBILOMYCES STROBILACEUS 2



STROBILOMYCES STROBILACEUS 3

DESCRIZIONE

Classe: Basidiomycetes

Ordine: Boletales

Famiglia: Boletaceae

Genere: Strobilomyces

Specie: *S. strobilaceus*

Cappello: largo in media 4,0-12,0 (ma talora fino a 16,0) cm; da globuloso a convesso-allargato, quasi sempre a centro sollevato; orlo prima aderente al gambo poi rialzato, frastagliato per resti di velo e scaglie cuticolari; superficie feltrosa, ricoperta da scaglie più o meno grandi; di colore grigio-bruno, più scuro nel tempo, sino a nerognolo.

Tubuli: sono grigio chiaro ma tendono anch' essi a divenire più scuri man mano che si allungano. Le stesse gradazioni di colore assumono i pori che col tempo si allargano assumendo forma poligonale. Tubuli e pori alla pressione possono acquisire tonalità rossastre.

Gambo: centrale rispetto al cappello, può elevarsi fino ad una misura pari al diametro pileico ed è diritto o lievemente incurvato, rigido e duro, pieno, poco più chiaro del colore del cappello; nella parte alta si nota, per un centimetro circa, una lieve reticolatura dovuta ad una breve decorrenza dei tubuli. L'anello, biancastro e lanoso, posto a protezione della superficie imeniale, è effimero e tende a sfilacciarsi e a scomparire lasciando sul gambo solo delle fioccosità.

Carne: stopposa, con odore e sapore insignificanti; quasi bianca ma con l'età più scura, al taglio vira al rosa-rosso e in seguito al viola ardesia.

Spore: quasi sferiche, delle dimensioni di 9-13 (15) × 7,5-11 (13) µm, con reticolo a creste sporgenti, in massa bruno-porpora

Autore della scheda: Bruno Cerantola

Autore delle foto: Bruno Cerantola