

SCHEDA N° 0244

ORDINE Agaricales

GENERE Tricholoma	SPECIE T. aurantium	AUTORE (Schaeff.) Ricken	
DATA DI RACCOLTA 16.sett. 018	LUOGO DI RACC. val Canali	COMUNE Tonadico	PROV. TN
ALTITUDINE S.L.M. 1200	I.G.M. I 062	RACCOGLITORE F.Flavio Pinton Dino G. Cerantola	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI: CONIFERE LATIFOGIE | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Abies alba-Fagus

NOTE : stazione di crescita di pochi esemplari sotto giovani Abeti bianchi

MICROSCOPIA: spore brevemente ellissoidali 6,4-7,6 x 4,5-5,2 µm, lisce, sporata bianca, basidi tetrasporici

BIBLIOGRAFIA : Funghi d'Italia A.M.B: vol.2 pag. 592 funghi d'Italia Zanichelli pag. 142 n°330

DETERMINATORE cds G.M.C

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



TRICHOLOMA AURANTIUM



TRICHOLOMA AURANTIUM



TRICHOLOMA AURANTIUM

DESCRIZIONE

Tricholoma aurantium

Ordine: Agaricales

Famiglia: Tricholomaceae

Genere: *Tricholoma aurantium*

Specie: *T. aurantium*

Sezione: Albobrunnea - Kuenher emend. Bon basidiomi di taglia medio-grandi, Cappello vischioso, di colore bruno-rossastro

Sinonimi: *Armillaria aurantia* (Schaeff.) Quél.
Gyrophila aurantia (Schaeff.) Quél.
Melanoleuca aurantia (Schaeff.) Murrill

Cappello: 5-10 cm; da convesso a leggermente conico, poi appianato con largo umbone ottuso, margine regolare, ± scanalato; superficie umido-vischiosa, brillante, asciutta e finemente squamoso-fibrillosa a tempo secco, rosso-arancio, bruno-arancio vivo, talvolta con macchie verdastre.

Lamelle: smarginato-uncinate, piuttosto fitte, bianche, con filo un po' denticolato, ± macchiato di bruno con l'età.

Carne: bianca; odore di cetriolo, sapore amaro.

Gambo: 5-10 x 1-1,5 cm; per lo più cilindrico, affusolato alla base, ricoperto da una sorta di guaina vischiosa, concolore al cappello, subito frammentata in scaglie disposte a strisce circolari bruscamente interrotte in alto, in modo da evidenziare il tratto apicale liscio e bianco.

Spore: brevemente ellissoidali 6,4-7,6 x 4,5-5,2 µm, lisce, sporata bianca, basidi tetrasporici

Habitat: estate-autunno; preferibilmente sotto aghifoglie, predilige pini e abeti bianchi, meno frequente sotto latifoglie. Poco comune.

Autore della scheda: Franco Flavio Pinton

Autore delle foto: Franco Flavio Pinton, Dino Giuseppe Cerantola