

SCHEDA N° 0197

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Tricholoma</i>	SPECIE <i>T. columbetta</i>	AUTORE (Fr.) P. Kumm.	
DATA DI RACCOLTA 04/11/2017	LUOGO DI RACC. Pian de Coltura	COMUNE Lentiai	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 745	I.G.M. III 063	RACCOGLITORE Dino Giuseppe Cerantola	

HABITAT:

<input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: LATIFOLIA		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI BETULLA - NOCCIOLO

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: BETULLA - NOCCIOLO

NOTE: stazione di crescita singola e-o gregaria; alla base del gambo ha sempre dei riflessi blu-verdastri

MICROSCOPIA: spore bianche in massa, ovoidali, 5,5-6 x 4-5 µm. lisce, generalmente guttulate.

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Zanichelli pag.136 al 316 - Funghi d'Italia vol 2 AMB a pag.580

DETERMINATORE Dino Giuseppe Cerantola

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



TRICHOLOMA COLUMBETTA



TRICHOLOMA COLUMBETTA



TRICHOLOMA COLUMBETTA



TRICHOLOMA COLUMBETTA



TRICHOLOMA COLUMBETTA

DESCRIZIONE

Tricholoma columbetta

Ordine: Agaricales

Famiglia: Tricholomataceae

Genere: Tricholoma columbetta

Specie: T. columbetta

Sezione: Equestria Konrad et Maubl. basidiomi di taglia medio-piccole pileo sericeo-fibrilloso squamuloso bianco

Sinonimi: Agaricus columbetta Fr.
Gyrophila columbetta (Fr.) Quéf.
Tricholoma impolitum (Lasch) P. Kumm.

Cappello: 6-10 cm, conico, campanulato, poi convesso, emisferico fino ad appianato, con umbone molto sfumato, carnoso, margine molto ondulato. Cuticola facilmente separabile, sericea-fibrillosa, lucida, brillante, non viscosa, bianca, picchiettata a volte di macchie rosate negli esemplari molto maturi.

Lamelle: fitte, elastiche, alternate da lamellule, con filo leggermente seghettato, di colore bianco.

Carne: bianca, soda nel cappello, molto fibrosa nel gambo, odore debole di farina e sapore dolciastro con retrogusto leggermente piccante.

Gambo: 5-10 x 1-2 cm; cilindrico, ricurvo, attenuato alla base, sericeo-fibrilloso, di colore bianco, quasi sempre macchiato di blu-verdastro alla base.

Spore: bianche in massa, ovoidali, 5,5-6 x 4-5 µm. lisce, generalmente guttulate.

Habitat: a gruppi ai margini dei boschi di latifoglie miste, simbionte. in estate-autunno comune.

Autore della scheda: Dino Giuseppe Cerantola

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola