

SCHEDA N° 0040

ORDINE Agaricales

GENERE TRICHOLOMA	SPECIE T. Goniospermum Trichosporum	AUTORE (R.MARIE) BON	
DATA DI RACCOLTA 30-06-10	LUOGO DI RACC. PARCO BOLASCO	COMUNE Castelfranco Veneto	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 44	I.G.M. II 104	RACCOGLITORE CERANTOLA GIUSEPPE	

HABITAT:

<input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: MISTO LATIFOGLIA		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Misto Latifoglia e Carpino, Celtis.

NOTE: Quattro periodi di crescita: primavera estate tarda estate e autunno.

MICROSCOPIA: Spore 8-10 x 5-6 , lisce, ialine, con grossa guttula centrale, con protuberanze angolose, triangolari, a croce

BIBLIOGRAFIA: Funghi d'Italia Volume 2 pag. 577 – I funghi dal vero Volume 1 pag. 130 - Bruno Cetto - Marchand 937

DETERMINATORE CERANTOLA GIUSEPPE


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



CARPOFORO



LAMELLE



SPORE



SPORATA BIANCA

DESCRIZIONE

Cappello: 4-10 cm. di diametro, molto carnoso e sodo, con cuticola asciutta, di colore violetto-lilla, inizialmente globoso poi piano convesso.

Gambo: 4-8 x 2,5-3,5 cm., cilindrico, ingrossato alla base, bianco e pruinoso in alto.

Carne: bianca e soda, odore di farina, sapore mite.

Habitat: cresce in grandi famiglie nei prati e nel sottobosco, formando file o cerchi, nel periodo tarda primavera estate tarda estate autunno.

Il carpoforo descritto convesce con *T.goniospermum* in autonomia con carpofori indipendenti mantenendo sempre il colore (rosato-violetto) del *T.Tricholosporum*, nei quattro periodi di crescita in pochi esemplari.

Autore della scheda - CERANTOLA GIUSEPPE DINO