

**SCHEDA N° 0248**

**ORDINE Agaricales**

<b>GENERE</b> <i>Tricholoma</i>	<b>SPECIE</b> <i>T. sculpturatum</i>	<b>AUTORE</b> (Fr.) Quéf.	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 19/11/2019	<b>LUOGO DI RACC.</b> Vallà	<b>COMUNE</b> Riese Pio X	<b>PROV.</b> TV
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 55 mt.	<b>I.G.M.</b> I 104	<b>RACCOGLITORE</b> Dino Giuseppe Cerantola	

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input checked="" type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<b>BOSCO DI :</b>		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :** Carpinus e Fagus.

**NOTE :** gruppetti sotto Carpino, Faggio e Nocciolo di un giardino domestico.

**MICROSCOPIA:** Spore 5,5-6,5 x 3-4 µm, bianche in massa, ellissoidali, lisce, guttulate. Basidi calvati tetrasporici.

**BIBLIOGRAFIA :** Funghi d'Italia Zanichelli a pag.132 al 298 ; Funghi d'Italia A.M.B. vol.1 a pag.60.

**DETERMINATORE** Cds G.M.C.

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**  FRESCHI  SECCHI



**TRICHOLOMA SCALPTURATUM**



**TRICHOLOMA SCALPTURATUM**



**TRICHOLOMA SCALPTURATUM**



**TRICHOLOMA SCALPTURATUM**

## DESCRIZIONE

Tricholoma scalpturatum

**Ordine:** Agaricales  
**Famiglia:** Tricholomataceae  
**Genere:** Tricholoma  
**Specie:** scalpturatum  
**Sezione:** Atrosquamosa

**Sinonimi:** Agaricus scalpturatus Fr.  
Cortinellus scalpturatus (Fr.) P. Karst.

**Cappello:** 4-6 cm; da conico-campanulato a umbonato espanso, convesso-umbonato, infine disteso, talvolta anche leggermente depresso, ma sempre con umbone al centro. Cuticola fibrillosa-lanosa, di colore grigio da chiaro a nerastro a beige, decorata da minuscole squamule appiattite, disposte concentricamente di colore più scuro.

**Lamelle:** smarginate e decorrenti con dentino, poco fitte, bianche o leggermente grigiastre, intercalate da lamellule, ingialliscono alla manipolazione, a maturazione diventeranno gialle, giallo brunastro con filo ondulato.

**Carne:** esigua quella del cappello, un po' fibrosa nel gambo, biancastra, sfumata di grigio chiaro sotto la cuticola, tendente ad ingiallire in vecchiaia, con odore e sapore marcati di farina fresca.

**Gambo:** 3-6 x 0,5-1 cm, cilindrico, slanciato, con base attenuata, bianco all'apice e sfumato di grigio altrove per la presenza di fibrille, a volte con resti di velo nei giovani esemplari, ingiallente al tocco e con l'età.

**Spore:** 5,5-6,5 x 3-4 µm., bianche in massa, ellissoidali, lisce, guttulate. Basidi calvati tetrasporici.

**Habitat:** specie molto comune ed abbondante, specialmente in boschi di conifere (pini, abeti e cedri), ma reperibile anche nei boschi di latifoglie, nelle radure erbose e nei parchi, nella tarda primavera ed in autunno.

Autore della scheda: Cds G.M.C.

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola