

**SCHEDA N° 0328**

**ORDINE Agaricales**

<b>GENERE</b> <i>Tricholoma</i>	<b>SPECIE</b> <i>T. Sejunctum</i> var. <i>coniferarum</i> .	<b>AUTORE</b> (Sowerby) Quél.	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 01-11-2022	<b>LUOGO DI RACC.</b> Bolzano Belunese	<b>COMUNE</b> Belluno	<b>PROV.</b> BL
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 532	<b>I.G.M. IV.</b> 063	<b>RACCOGLITORE</b> Mirco Bizzoto	

**HABITAT:**

<input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
<b>BOSCO DI:</b> LATIFOGIE E AGHIFOGIE		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE:** Bosco misto di latifoglie e aghifoglie soprattutto Pino Silvestre.

**NOTE:** Stazione di crescita, isolato o in piccoli gruppi tra l'erba sotto pino silvestre.

**MICROSCOPIA:** Spore: 6-8 x 5-7 micron, bianche, ellissoidali, ialine, guttulate,

**BIBLIOGRAFIA:** Funghi d'Italia Zanichelli pag. 134 al 307 - Funghi d'Italia AMB pag.53- Funghi in Italia Nicolò Oppicelli pag.328

**DETERMINATORE** C.d.S. Castellano GMC

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**  FRESCHI  SECCHI



**T. SEJUCTUM V. CONIFERARUM**



**T. SEJUCTUM V. CONIFERARUM**



**T. SEJUCTUM V. CONIFERARUM**



**T. SEJUCTUM V. CONIFERARUM**



**T. SEJUCTUM V. CONIFERARUM BASIDI**



**T. SEJUCTUM V. CONIFERARUM SPORE**

## DESCRIZIONE

*Tricholoma sejunctum* var. *coniferarum*.

**Ordine:** Agaricales

**Famiglia:** Tricholomataceae

**Genere:** **Tricholoma**

**Specie:** *Sejunctum* var. *coniferarum*.

**Sezione:** Sezione Equestrio Konrad et Maubl. - Basidiomi di taglia medio-piccola; pileo sericeo-fibrilloso, squamuloso; colore bianco, giallastro, giallo-verdastro. Carne con odore esaporo farinacei. U. af. talvolta presenti.

**Sinonimi:** *Agaricus coryphaeus* p. , Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 26 (1838) [1836-1838].  
*Melanoleuca sejuncta* (Sowerby) Murrill, N. Amer. FL. (New York) 10 (1): 25 (1914).  
*Tricholoma coryphaeum* (Fr.) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 95 (1874) [1878].  
*Tricholoma sejunctum* var. *coniferarum* Bon, Docum Mycol. 6 (nn. 22-23): 173 (1976).  
*Gyrophila coryphaea* (Fr.) Quéll., fl. mycol. Francia (Parigi): 287 (1888).

**Cappello:** 4-10 cm. conico, campanulato, convesso, poi piano, ondulato, a maturità un po' depresso attorno ad un umbone ± pronunciato, cuticola asportabile, da leggermente vischiosa ad asciutta, percorso da fibrille radiali, il colore è giallo-verde, giallo-olivastro, verde scuro. più scuro al centro.

**Lamelle:** Non fitte, smarginate ed attaccate al gambo con uncino, bianche, poi crema, spesso macchiate di giallo verso il margine.

**Carne:** Bianca, un po' fibrosa nel gambo, color crema, tenera sul cappello, se strofinata emana un odore farinaceo, mentre il sapore è prima mite poi amarognolo.

**Gambo:** 5-10 x 0,5-2 cm, pieno, cilindrico o affusolato o ritorto, fibrilloso bianco, con l'età può presentare sfumature giallo-verdastre.

**Spore:** 6-8 x 5-7 micron, bianche, ellissoidali, ialine, guttulate, Basiidi clavati, tetrasporici.

**Habitat:** Estate-autunno, sotto latifoglie ed aghifoglie.

Autore della scheda: Bruno Cerantola

Autore delle foto: Dino G. Cerantola